Spektralphotometrische Untersuchungen

an

Beta Lyrae

Diplomarbeit

von

Helmut Steinle

Durchgeführt

1976 / 1977

am

Institut für Astronomie und Astrophysik
München

unter Leitung von Prof. P. Wellmann

Inhalt	Seite
1. Einleitung und Aufgabenstellung	1
2. Messinstrumente und Beobachtungsbeschreibung	3
2.1 Messinstrumente	3
2.2 Beobachtungsbeschreibung	5
3. Messungen und Auswertung	7
3.1 Messungen mit Daten	9
3.2 Auswertung der Messungen am TR 440 - Rechner	12
3.2.1 Auswertung der Spektren - Temperaturbestimmung	13
3.2.2 Auswertung der Linienmessungen - Äquivalentbreitenbestimmung	20
3.3 Ergebnisse	26
3.3.1 Liste der berechneten Äquivalentbreiten und Farbtemperaturen	26
3.3.2 Graphische Darstellung der Messresultate	30
3.3.3 Verhalten der Gesamtspektren und der Temperaturen	40
3.3.4 Spektrales Verhalten in den Linienscans	42
3.3.5 Kurzzeitvariationen	57
3.3.6 H α , H β Äquivalentbreiten-Variation über verschiedene Perioden	58
4. Modelle des Systems Beta Lyrae	60
5. Interpretation der Messresultate	66
6. Zusammenfassung	70
7. Literatur	71

=====

Anhang

- A1 Auswerteformulare zur Temperaturbestimmung mit den dazugehörigen Spektren
- A2 Auswahl von Literatur über Beta Lyrae

=====

Verwendete Symbole und Werte der Konstanten

A	: Intensitätsverhältnis der Sternstrahlung (Gl.(7) S.16 und Gl.(7a) S. 18)
A_V	: Absorption im visuellen Spektralbereich
$I(\lambda)$	: Intensität der Strahlung an der Erdoberfläche
K	: Kelvin
L_i	: Lagrange - Punkt Nr. i
M	: Absolute Helligkeit in Grössenklassen "m"
$M_\odot$	: Masse der Sonne = $1.989 \cdot 10^{30} \text{kg}$
MEZ	: Mitteleuropäische Zeit
P	: Phase
R	: Sternradius
$R_\odot$	: Sonnenradius = $6.960 \cdot 10^8 \text{m}$
T	: Farbtemperatur (auch T'_f ; T'_p)
W_λ	: Äquivalentbreite in nm (Nanometer)
WZ	: Weltzeit
a	: Jahr
$a(\lambda)$	: interstellare Extinktion
c	: Lichtgeschwindigkeit im Vakuum = $2.9979 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
d	: Tag
$f(\lambda)$	: absolute Strahlungsverteilung (eines Sterns)
h	: Planck'sche Konstante = $6.6262 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$
k	: Boltzmann Konstante = $1.3806 \cdot 10^{-24} \text{ J/K}$
m	: scheinbare Helligkeit in Grössenklassen "m"
m	: Grössenklasse
nm	: Nanometer = 10^{-9}m
pc	: Parsec = $3.0857 \cdot 10^{16} \text{m}$
r	: Entfernung eines Sterns
$\xi(\lambda, t)$	: instrumentelle Einflüsse auf registrierte Sternstrahlung
λ	: Wellenlänge in nm (Nanometer)

1. EINLEITUNG UND AUFGABENSTELLUNG

Der Stern Beta im Sternbild Lyra (Leier) wurde 1784 von Goodricke als veränderlich erkannt und 1891 von Pickering als spektroskopischer Veränderlicher klassifiziert. Dass Beta Lyrae in der Literatur zu einem immer wieder untersuchten Einzelobjekt wurde, hat seinen Grund in den merkwürdigen, bis heute noch nicht voll verstandenen Erscheinungen in seiner Lichtkurve, besonders aber in seinem spektralen Verhalten. Obwohl schon sehr bald Lichtkurven vorlagen (z.B. Argelander 1895) und auch schon eine Temperaturbestimmung erfolgte [22]*, konnte erst 1941 eine einigermaßen fundierte Zusammenfassung der Beobachtungen und deren Interpretation erscheinen [5]. Das damals von O. Struve vorgeschlagene Modell für Beta Lyrae hat zwar seither einige Modifikationen erfahren, zieht sich aber wie ein roter Faden bis in neueste Abhandlungen, wie z.B. von Huang, Hack u. a.. Zwei Beobachtungsreihen der Internationalen Astronomischen Union wurden 1959 und 1971 mit dem Ziel durchgeführt, ein grösseres Datenmaterial über den Stern zu erhalten [10, 2]. In jüngster Zeit wurden etliche UV und IR Beobachtungen von Erdsatelliten und der Raumstation Skylab aus gemacht, um auch in diesen, von der Erde aus unzugänglichen Spektralbereichen, das Bild von Beta Lyrae zu vervollständigen.

Nach den neuesten Arbeiten lässt sich das System von Beta Lyrae wie folgt beschreiben:

Der (Doppel-) Stern Beta Lyrae ist Mitglied in dem visuellen Mehrfachsystem ADS 11745. Als physische Begleiter sind jedoch nur zwei weitere Sterne, von denen einer wiederum ein spektroskopischer Doppelstern ist, mit Sicherheit festgestellt [1]. Beta Lyrae ist bedeckungsveränderlich und hat im Spektrum besondere Eigenschaften. Es ergeben sich für das System folgende Daten:

Nummer im Henry Draper Katalog	HD 174638	
Rektaszension (2000)	$18^{\text{h}}50^{\text{m}}04^{\text{s}}$	$\frac{8}{[29]}$
Deklination (2000)	$+ 33^{\circ}22'$	
Entfernung	$< 260 \text{ pc}$	[1]
Periode	12.9327^{d}	
scheinbare visuelle Helligkeit	$m_v = 3.5 - 4.3$	
	Hauptstern	Begleiter
Masse	$1 - 4 M_{\odot}$	$10 - 14 M_{\odot}$
Radius	$10 - 16 R_{\odot}$	$4 - 5 R_{\odot}$
absolute visuelle Helligkeit	$-3.6 / -3.8$	$-1.4 / -2.4$
Spektrum	B 8 III	B 0 - B 2
(Abstand der Komponenten $20 - 30 R_{\odot}$)		alles [7]

Das Problem, das immer noch nicht endgültig gelöst ist, ist die Natur des Begleiters. Es hat sich im Laufe der Zeit jedoch das

* Die in eckigen Klammern aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Nummer der zitierten Arbeit im Literaturverzeichnis (S.71).

Modell als am Besten erwiesen, in dem der Begleiter von einer relativ dicken Scheibe eingehüllt ist, die in der Bahnebene konzentriert ist. Abbildung 1 gibt dieses Modell nach [7 und 23] wieder.

Abb. 1

Da in der Literatur bis zu Beginn der vorliegenden Arbeit Beobachtungen von Beta Lyrae mit einem Spektrum-Scanner nicht erwähnt wurden, bot es sich an, den an der Universitäts-Sternwarte München von R. Schoembs gebauten Scanner zur Beobachtung von Beta Lyrae einzusetzen um besonders das Verhalten von bestimmten Spektrallinien sowohl über Phase und Periode, als auch im Kurzzeitbereich zu messen. Während der Arbeit berichtete A. Sanyal [15] über ähnliche Messungen, die sehr gut als Vergleich dienen können. Da schon einige Scanner-Messungen von Beta Lyrae an der Sternwarte München 1975 durchgeführt wurden, können diese ebenfalls zum Vergleich verwendet werden.

Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit war es, mittels der vorgegebenen Instrumentierung (Spektrum-Scanner) die spektralen Eigenschaften von Beta Lyrae und deren Veränderlichkeit, soweit sie damit zugänglich waren, zu registrieren und an Hand der verschiedenen Modelle zu diskutieren.

An Beobachtungsmaterial wurde gewonnen:

- 92 Äquivalentbreiten der Linien $H\alpha$, $H\beta$ und $He I$
(587.5 nm) von Beta Lyrae,
- 61 Spektren im Bereich 400 - 800 nm von Alpha,
Beta und Gamma Lyrae.

Die Messungen von Beta Lyrae verteilen sich über alle Phasen, jedoch erfolgten sie während verschiedener Perioden.

2. MESSINSTRUMENTE UND BEOBACHTUNGSBESCHREIBUNG

Im Folgenden werden die Instrumente die bei der Messung verwendet wurden und die Beobachtungsmethodik in einzelnen beschrieben. Die dabei angegebenen Daten beziehen sich auf die Messungen dieser Arbeit.

2.1. Messinstrumente

Fernrohr:

Die Beobachtungen wurden am Fraunhofer-Refraktor der Sternwarte München durchgeführt. Das Fernrohr hat eine Öffnung von 28 cm und eine Brennweite von 5 m. Das Objektiv ist für den visuellen Farbbereich korrigiert.

Nachführung:

Die Grob-Nachführung erfolgte über einen Synchronmotor, der über einen Sternzeitgenerator bzw. über die Netzfrequenz gesteuert wurde. Zur Fein-Nachführung wurde das von U. Babst [2] gebaute photoelektrische Nachführsystem verwendet. Dieses benützt einen Leitstern mit $m_V \leq 7^m$ aus der näheren Umgebung des zu messenden Sterns, wobei das Licht des Leitsterns aus dem Hauptstrahlengang durch einen kleinen verstellbaren Spiegel herausgelenkt wird. Dieser "offset-guiding" Betrieb ist durch das von R. Schoembs gebaute "Off-set-Teil" möglich, das vor dem Fokus des Fernrohres angebracht wird und gleichzeitig als Träger für den Spektrumscanner und das Kontrollokular dient. Das Nachführsystem arbeitet mit einer rotierenden Sektorblende, wobei der aus dem Zentrum der Blende herauswandernde Leitstern das von einem Photomultiplier empfangene Signal verändert, was zusammen mit der Stellung der Sektorblende eine gezielte Korrektur der Nachführung ermöglicht (nach Babcock).

Da beim Einstellen der automatischen Nachführung auf einen Leitstern das genaue Justieren sehr umständlich war, wurde gemeinsam mit M. Gottwald, der im gleichen Zeitraum am Refraktor photoelektrische Messungen durchführte, ein Verbesserungsvorschlag für die Nachführungseinstellung entworfen. Jetzt lassen sich die beiden Schlitten, auf denen das Nachführsystem befestigt ist und die zur Einstellung des Leitsterns verschiebbar sind, in der letzten Phase des Einstellens über Feineinstellschrauben leicht und genau in die richtige Stellung bewegen.

Spektrumscanner:

Ein Spektrumscanner misst schrittweise die Intensität des Spektrums in einem bestimmten Wellenlängenintervall. Da diese Messungen sehr rasch aufeinander folgen können, ist es möglich, in kurzer Zeit mehrmals die Intensitätsverteilung innerhalb eines bestimmten Intervalls zu messen. Ein solcher Messvorgang wird als Scan bezeichnet.

Die spektrale Verteilung der Strahlung des Messobjektes wurde mit dem ebenfalls von R. Schoembs gebauten Spektrumscanner - 2 Kanal - Photometer gemessen, das wie folgt aufgebaut ist [17]: Das durch eine kreisförmige Blende von 1 mm Durchmesser in den Scanner einfallende Sternlicht wird von einem drehbar angeordneten Gitter spektral zerlegt. Dieses Strichgitter hat eine Teilung von 1200 Linien pro mm und eine Grösse von 26×26 mm. Die-

ses Gitter kann von einem Schrittmotor mit 0.023 nm/Schritt und maximal 1000 Schritten pro Sekunde um eine Achse parallel zur Strichrichtung gedreht werden. Das mit dem Gitter erzeugte Spektrum wird von zwei Spiegeln auf zwei Spalte abgebildet, die vor den Ausgängen zu je einem Multiplier EMI 9558 angeordnet sind. Durch die Drehung des Gitters streicht das Spektrum über diese Spalte und es kann so die spektrale Verteilung der Intensität schrittweise gemessen werden. Dabei ist die Lage der Spektrumsabschnitte auf den beiden Spalten unabhängig voneinander frei wählbar, sodass simultane Messungen von z.B. $H\alpha$ und $H\beta$ möglich sind. Da das Bild des Sterns in der Öffnung der Eintrittsblende durch atmosphärische Einflüsse (Refraktion, Szintillation und "Seeing") nicht stets genau am gleichen Ort und in der gleichen Grösse erscheint, ist die Auflösung des Spektrumscanners je nach Bildgrösse verschieden und schwankt zwischen 1 nm bis 3 nm . Den schematischen Aufbau des Spektrumscanners zeigt die Abbildung 2. Der Scanner wird elektronisch so gesteuert, dass die von den Multipliern gemessenen Photonenströme (=Pulse) während einer einstellbaren Zeit summiert werden.

- D : Drehachse
- EB: Eintrittsblende
- G : Gitter
- KA: Kameraspiegel
- KO: Kollimator
- MP: Multiplier
- F : Rot-Filter
- S : Spalt
- SM: Schrittmotor

Abb. 2
(Aufbau des Spektrumscanners)

Steuerelektronik:

Als Zeitbasis dient ein mit 10 MHz schwingender Quarz. Durch Division werden die zur Steuerung der verschiedenen Geräte notwendigen Frequenzen erzeugt. Damit wird der Schrittmotor des Spektromscanners gesteuert, der mit 8 ms ($H\alpha$, $H\beta$) bzw. 4 ms (Spektren) pro Schritt betrieben wird. Pro Messwert werden jeweils die Photonen über 8 bzw. 16 Schritte summiert, mit einem Faktor 2 untersetzt und von der Zählerlektronik binär gezählt. Dieses Messresultat wird dann von der Stanzelektronik auf 8-Kanal Lochstreifen ausgegeben.

Den schematischen Gesamtaufbau der Messeinrichtung gibt die Abbildung 3 wieder.

Abb. 3
 (Gesamtaufbau der Messeinrichtung)

2.2 Beobachtungsbeschreibung

Die Messungen an einem Objekt wurden stets von Messungen des Himmelshintergrundes (HH) eingeschlossen. Dazu wurde das Fernrohr in eine nahe, sternfreie Zone in der Umgebung des Objektes geschwenkt. Die Messungen des Himmelshintergrundes (+ Dunkelstrom der Multiplii) sind daher auf den Lochstreifen am Anfang und am Ende zu finden. Zwischen Himmelshintergrund und Objektmessung wurden stets eine (oder mehrere) leere Blockmarken gestanzt.

Zur leichteren Reduktion wurde bei Spektrommessungen der Vergleichstern auf dem selben Lochstreifen wie der Messtern erfasst, wobei die trennende Himmelshintergrund-Messung für beide Messungen verwendet wurde. Die Reihenfolge war also stets

HH - Vergleichstern - HH - Messtern - HH .

Bei Spektromscans, d.h. bei Scans die sich über das beobachtbare Spektrum erstreckten, umfasst eine HH-Messung stets 2 Scans, so dass auf einem Lochstreifen mit Spektromscans 6 HH-Messungen und 2 mal 3 Objekt-Messungen vorliegen.

Die im Anschluss an die Spektrommessungen erfolgenden Messungen von $H\alpha$, $H\beta$ (1 Lochstreifen) und He I (1 Lochstreifen) hatten in

der Regel einen analogen Aufbau mit 8 HH-Scans, ~ 160 H α , H β oder He I Scans und ~ 8 HH-Scans. Unter z.B. H α -Scan ist dabei die Registrierung der Intensitätsverteilung der Strahlung in einem Wellenlängenintervall, das H α enthält, gemeint. Da die Linien-Scans im Anschluss an die Beta Lyrae Spektrummessungen erfolgten, musste die Nachführung nicht verändert werden. Zum absoluten Anschluss wurden auch noch vergleichende Spektrummessungen Alpha Lyrae - Gamma Lyrae - Beta Lyrae durchgeführt.

Die Zeitangaben auf den Lochstreifen und im Beobachtungsbuch sind in MEZ angegeben und auf volle Minuten gerundet. Gestartet wurde eine Messung immer bei vollen 5 Minuten. Die Startgenauigkeit betrug ± 15 Sekunden; bei einer Periodenlänge von ca. 13 Tagen bedeutet eine Unsicherheit von 10 Minuten nur einen Fehler von 5×10^{-4} in der Phase. Zur weiteren Berechnung wurde die mittlere Zeit der Beobachtung verwendet, die sich bei Linienmessungen auf Scanbeginn (= Anfang der ersten HH-Messung) plus 15 Minuten und bei Spektrummessungen auf Scanbeginn plus 10 Minuten für Gamma Lyrae und plus 30 Minuten für Beta Lyrae einstellte. (Abweichungen sind im Beobachtungsbuch vermerkt!) Die Umrechnung auf Weltzeit WZ wurde mit

$$WZ = MEZ - 1^h$$

vorgenommen.

Die Festlegung des Seeings erfolgte über eine Abschätzung der maximalen Abweichung (in ") vom mittleren Ort des Stern-Bildes bei Betrachtung in einem Gesichtsfeld bekannter Grösse. Dazu wurde eine Blende verwendet, die ein Gesichtsfeld von 12" darstellte (Durchmesser 0.3 mm). Das durch die Atmosphäre bedingte Seeing war zum grossen Teil schlecht (meisst 6"-7"), sodass kaum einmal sehr gute Beobachtungsbedingungen gegeben waren.

Da in den ersten zwei Monaten nach Beginn der Arbeit sehr günstige Witterungsverhältnisse herrschten, konnte genügend Beobachtungsmaterial gewonnen werden, um dann trotz des später sehr schlechten Wetters, das bis zum Ende der Arbeit anhielt, eine relativ gleichmässige Verteilung der Messungen über die gesamte Phase zu erhalten.

Periode.

3. MESSUNGEN UND AUSWERTUNG

Zur Auswahl der weiterhin genauer zu untersuchenden spektroskopischen Details wurde zuerst das gesamte Spektrum von Beta Lyrae im Bereich von 300 nm bis 850 nm gemessen. Es traten folgende drei Emissionslinien am deutlichsten hervor:

H α	bei	656.3 nm
He I	bei	587.5 nm
H β	bei	486.1 nm

Diese drei Linien wurden daraufhin zusätzlich zum gesamten Spektrum als Gegenstand der Beobachtung ausgewählt.

Das Gesamtspektrum wurde gleichzeitig in zwei Kanälen aufgenommen, wobei mit Kanal 1 (blau) der Spektralbereich von 300 nm bis 700 nm und mit Kanal 2 (rot) der Spektralbereich von 470 nm bis 850 nm überdeckt wurde.

(Als Beispiel für ein solches Gesamtspektrum und für die Sichtbarkeit der Linien vgl. die Abbildungen 4 und 5 auf den Seiten 7 und 8. Der Nullpunkt der Wellenlängen-Skala ist willkürlich, der Masstab ist richtig (vgl. Seite 12 unten).)

LYR037
76-07-16-21-50-00
SPEKTRUM BETA LYRAE (KANAL 1 - BLAU)
PHASE 003.104

Abb. 4

(Gesamtspektrum Beta Lyrae Kanal 1 mit Linienidentifikation)

LYR037
 76-07-16-21-50-00
 BETA LYRAE SPEKTRUM KANAL 2 (ROT)
 PHASE 003.104

Abb. 5

(Gesamtspektrum Beta Lyrae Kanal 2 mit Linienidentifikation)

Bei den Linienscans wurde ein Bereich von 23.6 nm in die Messung einbezogen um das Kontinuum festlegen zu können. Die fest eingestellte Wellenlängendifferenz der Kanäle 1 und 2 betrug 170 nm, sodass H α und H β simultan gemessen werden konnten. He I wurde mit Kanal 2 gemessen, wobei dann im Kanal 1 ein Bereich um die Wellenlänge 417.2 nm mitregistriert wurde, in dem aber keine Linien sichtbar waren und der auch kaum eine Änderung mit der Phase zeigte.

3.1 Messungen mit Daten

Im Zeitraum 76-06-09 (1. Messung) bis 77-07-22 (letzte Messung) wurden in 23 Nächten 90 einzelne Beobachtungen (= Zahl der Lochstreifen) gewonnen. Die einzelnen Beobachtungen mit den verschiedenen Daten sind in der folgenden Tabelle 1 zusammengefasst. Die Schreibweise von Datum und Zeit erfolgt nach DIN 1355. Es sind folgende Spalten von links nach rechts in der Tabelle verwendet:

- 1) Kennz. : Kennzeichen der Beobachtung = Kennzeichen des Lochstreifens
- 2) Datum : Jahr - Monat - Tag
- 3) WZ : Weltzeit; gilt für die Mitte der Beobachtung
- 4) Objekt : H α , H β , He I oder Spektrum
- 5) Epoche : Die Epoche der Phase (Periode) ist
J. D. 2442936.246 ($\hat{=}$ 76-06-06-17.54.14 (WZ)).
Die Berechnung der Phase erfolgte nach [mod.14] mit J. D. 2442936.246 + 12.9327 E.
- 6) Scans : Anzahl der brauchbaren Scans pro Messung
- 7) Seeing : Abweichung des Sternbildes in " vom mittleren Ort
- 8) Wolken : Angabe in %; N = Nebel; D = Dunst;
- 9) Temperatur: Lufttemperatur in Grad Celsius auf volle Grad gerundet
- 10) Höhe : Höhe des Objektes über dem Horizont auf volle Grad gerundet.

Die neben den Zeilen stehenden kleinen Buchstaben verweisen auf besondere Bemerkungen zu den jeweiligen Messungen und sind auf der gleichen Seite am Ende der Tabelle aufgeführt.

Tabelle 1

Kennz.	Datum	WZ	Objekt	Epoche	Sc	S	W	T	H	
LYR001	76-06-09	22.35.00	β Lyr-Spektrum	00.247	32	3	0	+19	60	a, b)
LYR002	76-06-10	00.05.00	β Lyr- H α , H β	00.252	310	3	0	+18	73	a, c)
LYR003	76-06-15	00.15.00	β Lyr-Spektrum	00.639	17	4	0	+19	75	a, d)
LYR004	76-06-15	01.30.00	β Lyr- H α , H β	00.643	156	4	0	+18	71	a, d)
LYR005	76-06-17	22.00.00	β Lyr-Spektrum	00.864	18	5	0	+16	60	
LYR006	76-06-17	23.00.00	β Lyr- H α , H β	00.867	98	6	0	+16	68	
LYR007	76-06-17	23.40.00	β Lyr- H α , H β	00.869	160	6	0	+15	74	
LYR008	76-06-18	00.15.00	β Lyr-Spektrum	00.871	20	6	0	+14	75	
LYR009	76-06-21	21.50.00	β Lyr-Spektrum	01.172	16	5	0	+21	61	e)
LYR010	76-06-21	22.20.00	β Lyr- H α , H β	01.174	154	5	0	+21	66	e)
LYR011	76-06-22	23.45.00	β Lyr-Spektrum	01.256	17	6	20	+21	75	
LYR012	76-06-23	00.20.00	β Lyr- H α , H β	01.258	156	6	20	+20	75	
LYR013	76-06-23	00.55.00	β Lyr-Spektrum	01.260	18	6	20	+20	72	f)
LYR014	76-06-23	01.30.00	β Lyr- H α , H β	01.262	160	6	20	+20	67	
LYR015	76-06-27	23.15.00	β Lyr-Spektrum	01.641	18	4	0	+21	74	

- a) Blaufilter in Kanal 1
- b) 512 Punkte pro Scan
- c) 64 Punkte pro Scan
- d) automatische Nachführung versagt wegen nahestehendem Mond
- e) automatische Nachführung setzt aus
- f) Messung 5 Minuten unterbrochen da Wolken durchziehen

Tabelle 1 Forts.

Kennz.	Datum	WZ	Objekt	Epoche	Sc	S	W	T	H
LYRo16	76-06-28	00.30.00	β Lyr- H α , H β	01.645	158	4	0	+20	72
LYRo17	76-06-28	01.00.00	β Lyr-Spektrum	01.647	18	4	0	+20	69
LYRo18	76-06-28	01.30.00	β Lyr- H α , H β	01.648	154	4	0	+20	64
LYRo19	76-06-30	21.00.00	β Lyr-Spektrum	01.866	12	6	0	+24	61
LYRo20	76-06-30	21.40.00	β Lyr- H α , H β	01.868	160	6	0	+23	65
LYR A	76-06-30	22.35.00	γ Lyr-Spektrum	-	9	7	0	+23	70
LYR B	76-06-30	23.15.00	γ Lyr- H α , H β	-	160	7	0	+21	73 g)
LYRo21	76-07-01	00.15.00	β Lyr-Spektrum	01.876	8	7	0	+20	73
LYRo22	76-07-01	00.45.00	β Lyr- H α , H β	01.877	158	6	0	+20	70
LYRo23	76-07-02	00.00.00	β Lyr-Spektrum	01.953	18	6	0	+21	74
LYRo24	76-07-02	01.10.00	β Lyr- H α , H β	01.956	120	6	0	+20	65 h)
LYR C	76-07-02	01.55.00	γ Lyr-Spektrum	-	18	6	0	+20	58
LYRo25	76-07-06	21.10.00	γ Lyr-Spektrum	-	7	5	0	+22	62 i)
	76-07-06	21.20.00	β Lyr-Spektrum	02.331	10	5	0	+22	67 i)
LYRo26	76-07-06	22.05.00	β Lyr- H α , H β	02.333	156	5	0	+21	71 j)
LYRo27	76-07-06	22.40.00	β Lyr- He I	02.335	82	5	0	+20	75 k)
LYRo28	76-07-06	23.30.00	γ Lyr-Spektrum	-	5	5	0	+20	74
	76-07-06	23.40.00	β Lyr-Spektrum	02.338	5	5	0	+20	73
LYRo29	76-07-07	00.30.00	β Lyr- H α , H β	02.341	150	5	0	+18	68
LYRo30	76-07-07	01.10.00	β Lyr- He I	02.343	90	5	0	+18	63
LYRo31	76-07-11	21.40.00	γ Lyr-Spektrum	-	8	7	D	+25	69 l)
	76-07-11	21.50.00	β Lyr-Spektrum	02.719	8	7	D	+25	73 l)
LYRo32	76-07-11	22.25.00	β Lyr- H α , H β	02.721	160	7	D	+22	75 l)
LYRo33	76-07-11	23.00.00	β Lyr- He I	02.723	160	7	D	+22	75 l)
LYRo34	76-07-11	23.45.00	γ Lyr-Spektrum	-	8	7	D	+21	72 l)
	76-07-12	00.00.00	β Lyr-Spektrum	02.726	7	7	D	+21	69 l)
LYRo35	76-07-12	00.30.00	β Lyr- H α , H β	02.727	156	7	D	+21	65 l)
LYRo36	76-07-12	01.05.00	β Lyr- He I	02.729	156	7	D	+20	60 l)
LYRo37	76-07-16	21.00.00	γ Lyr-Spektrum	-	6	6	5	+26	67 m)
	76-07-16	21.15.00	β Lyr-Spektrum	03.104	6	6	5	+26	71 m)
LYRo38	76-07-16	21.50.00	β Lyr- H α , H β	03.106	145	6	5	+25	74 m)
LYRo39	76-07-16	22.30.00	β Lyr- He I	03.108	158	6	5	+25	75 m)
LYRo40	76-07-16	23.35.00	α Lyr-Spektrum	-	18	6	5	+25	73 m)
LYRo41	76-07-17	00.20.00	γ Lyr-Spektrum	-	8	6	5	+24	64 m)
	76-07-17	00.45.00	β Lyr-Spektrum	03.115	8	6	5	+24	59 m)
LYRo42	76-07-17	01.15.00	β Lyr- H α , H β	03.117	156	6	5	+22	56 m)
LYRo43	76-07-17	01.50.00	β Lyr- He I	03.118	158	6	5	+22	49 m)
LYRo44	76-07-18	22.40.00	γ Lyr-Spektrum	-	8	7	15	+25	74 m)
	76-07-18	23.05.00	β Lyr-Spektrum	03.264	8	7	15	+25	72 m)
LYRo45	76-09-07	20.40.00	γ Lyr-Spektrum	-	8	6	5	+14	66 n)
	76-09-07	20.50.00	β Lyr-Spektrum	07.200	8	6	5	+14	64 o)
LYRo46	76-09-07	21.25.00	β Lyr- H α , H β	07.202	146	6	5	+14	59
LYRo47	76-09-07	22.00.00	β Lyr- He I	07.204	146	6	5	+12	53

g) Lochstreifen beschädigt - keine Auswertung

h) Scan-Nullpunkt mehrmals verschoben

i) ab LYRo25 Spektren von Gamma und Beta Lyrae auf einem Lochstreifen

j) endgültig Scan-Nullpunkt festgelegt

k) He I Emissionslinie bei $\lambda = 587.5$ nm

l) nahestehender Mond stört

m) Fokus des Fernrohres verstellt

n) Filter in Kanal 1, Verstärker Kanal 2 defekt

o) Filter in Kanal 1

Tabelle 1 Forts.

Kennz.	Datum	WZ	Objekt	Epöche	Sc	S	W	T	H
LYRo48	76-09-07	22.35.00	γ Lyr-Spektrum	-	6	6	5	+12	49
	76-09-07	22.50.00	β Lyr-Spektrum	07.207	7	6	5	+12	44
LYRo49	76-09-07	23.30.00	β Lyr- H α , H β	07.209	154	6	5	+12	38
LYRo50	76-09-08	00.35.00	β Lyr- He I	07.213	158	6	5	+12	28
LYRo51	76-09-22	19.10.00	γ Lyr-Spektrum	-	6	5	N	+13	70 p)
	76-09-22	19.40.00	β Lyr-Spektrum	08.357	6	5	N	+13	66 p)
LYRo52	76-09-22	20.05.00	β Lyr- "H α , H β "	08.358	156	5	N	+13	63 p)
LYRo53	76-09-22	20.40.00	β Lyr- "He I"	08.360	158	5	N	+12	56 p)
LYRo54	76-09-22	21.25.00	γ Lyr-Spektrum	-	6	5	N	+11	50
	76-09-22	21.45.00	β Lyr-Spektrum	08.363	8	5	N	+11	46
LYRo55	76-09-22	22.15.00	β Lyr- H α , H β	08.365	158	5	N	+11	41
LYRo56	76-09-22	22.45.00	β Lyr- He I	08.366	158	5	N	+11	36
LYRo57	76-09-22	23.25.00	γ Lyr-Spektrum	-	8	5	N	+10	31
	76-09-22	23.45.00	β Lyr-Spektrum	08.370	8	5	N	+10	26
LYRo58	76-09-23	00.15.00	β Lyr- H α , H β	08.371	74	5	N	+10	22 q)
LYRo59	76-09-23	21.00.00	γ Lyr-Spektrum	-	8	7	N	+13	53
	76-09-23	21.20.00	β Lyr-Spektrum	08.439	8	7	N	+13	49
LYRo60	76-09-23	21.55.00	β Lyr- H α , H β	08.441	130	7	N	+12	44
LYRo61	76-09-23	22.25.00	β Lyr- He I	08.443	154	7	N	+12	39
LYRo62	76-09-24	19.55.00	γ Lyr-Spektrum	-	6	4	o	+16	64
	76-09-24	20.20.00	β Lyr-Spektrum	08.513	6	4	o	+16	58
LYRo63	76-09-24	20.45.00	β Lyr- H α , H β	08.515	158	4	o	+16	55
LYRo64	76-09-24	21.15.00	β Lyr- He I	08.516	156	4	o	+16	50
LYRo65	76-10-26	17.55.00	γ Lyr-Spektrum	-	8	6	o	+10	63
	76-10-26	18.15.00	β Lyr-Spektrum	10.981	4	6	o	+10	59
LYRo66	76-10-26	18.45.00	β Lyr- H α , H β	10.983	156	6	o	+10	54
LYRo67	76-10-26	19.15.00	β Lyr- He I	10.984	162	6	o	+10	49
LYRo68	76-10-26	20.35.00	α Lyr-Spektrum	-	8	6	o	+09	37 r)
	76-10-26	20.55.00	γ Lyr-Spektrum	-	8	6	o	+09	36
LYRo69	76-10-26	21.15.00	γ Lyr-Spektrum	-	8	6	o	+08	30
	76-10-26	21.40.00	β Lyr-Spektrum	10.992	4	7	10	+08	24
LYRo70	76-10-26	22.10.00	β Lyr- H α , H β	10.994	150	7	N	+08	20
LYRo71	76-10-26	22.40.00	β Lyr- He I	10.995	152	7	N	+08	16
LYRo72	76-11-28	17.05.00	α Lyr-Spektrum	-	18	7	20	+07	50 r)
LYRo73	76-11-28	17.50.00	γ Lyr-Spektrum	-	18	7	20	+06	41
LYRo74	76-12-27	19.00.00	β Lyr- H α , H β	-	-	-	-	-	- s)
LYRo75	77-05-25	21.30.00	γ Lyr-Spektrum	-	8	4	5	+17	38 t)
	77-05-25	21.50.00	β Lyr-Spektrum	27.308	8	4	5	+17	44 t)
LYRo76	77-05-25	22.25.00	β Lyr- H α , H β	27.310	154	4	5	+16	49 t)
LYRo77	77-05-25	22.55.00	β Lyr- He I	27.311	99	4	5	+16	54
LYRo78	77-06-01	23.10.00	γ Lyr-Spektrum	-	8	3	o	+14	59
	77-06-01	23.30.00	β Lyr-Spektrum	27.854	8	3	o	+14	63
LYRo79	77-06-01	23.50.00	β Lyr- H α , H β	27.856	158	3	o	+11	66
LYRo80	77-06-02	00.20.00	β Lyr- He I	27.857	154	3	o	+10	70
LYRo81	77-07-12	21.05.00	γ Lyr-Spektrum	-	8	4	o	+25	65
	77-07-12	21.25.00	β Lyr-Spektrum	31.018	8	4	o	+25	68
LYRo82	77-07-12	21.45.00	β Lyr- H α , H β	31.019	158	4	o	+23	70
LYRo83	77-07-12	22.20.00	β Lyr- He I	31.021	160	5	o	+22	74

p) Scan-Nullpunkt falsch

q) sehr schlechte Sicht

r) mit Objektivblende, Nachführung von Hand

s) Stanzer stanzt Blockmarken nicht äquidistant - nicht auswertbar

t) Stern nicht im Zentrum der Blende

Tabelle 1 Forts.

Kennz.	Datum	WZ	Objekt	Epoche	Sc	S	W	T	H
LYRo84	77-07-12	22.50.00	β Lyr-Spektrum	31.023	8	5	10	+22	75
	77-07-12	23.05.00	δ Lyr-Spektrum	-	8	5	10	+22	74
LYRo85	77-07-22	21.05.00	δ Lyr-Spektrum	-	8	7	20	+16	70
	77-07-22	21.30.00	β Lyr-Spektrum	31.791	8	7	20	+16	74
LYRo86	77-07-22	21.55.00	β Lyr- H α , H β	31.793	48	7	20	+16	75
LYRo87	77-07-22	22.30.00	β Lyr- He I	31.795	134	7	20	+16	75
SPAoo1	75-02-27	02.42.00	β Lyr- H α , H β	-37.999	----	-	----	----	26 u)
SPAoo2	75-02-28	02.10.00	β Lyr- H α , H β	-36.075	----	-	----	----	26 u)
SPAoo3	75-03-01	03.01.00	β Lyr- H α , H β	-36.155	----	-	----	----	31 u)
SPAoo4	75-03-07	02.22.15	β Lyr- H α , H β	-36.616	----	-	----	----	28 u)

u) Messungen von Chr. Spannagl

3.2 Auswertung der Messungen am TR 440 - Rechner

Die bei den Messungen gewonnenen Daten, die auf Lochstreifen vorlagen, wurden an dem Telefunken - Rechner 440 des Leibniz-Rechenzentrums München ausgewertet. Dazu wurden alle Lochstreifen zuerst auf Magnetband gespeichert, sodass sie stets verfügbar waren. Die eigentliche Auswertung erfolgte mit einem Programm von R. Schoembs.

Zunächst wurden alle Messungen gleich verarbeitet. Nach dem Lesen der Daten vom Magnetband und dem Umordnen der Rückwärtsscans wurde die bei der Verstärkung erfolgte Untersetzung der Photonenströme um den Faktor 2 rückgängig gemacht. Dann wurden aus den Himmelshintergrundmessungen vor und nach der Objektmessung durch eine lineare Interpolation der Anteil von Hintergrund und Dunkelstrom bestimmt und von den Messwerten abgezogen. Der Betrag des Hintergrundes und Dunkelstromes und deren Streuung werden im Rechnerprotokoll ausgegeben. Die Überlagerung der brauchbaren Scans konnte in beliebiger Gruppenzahl durchgeführt werden. Weiter war wahlweise eine korrelierte Überlagerung oder eine unkorrelierte Überlagerung möglich. Bei der korrelierten Überlagerung wurde ein Referenzscan angegeben, zu dem die Korrelation in einem angebbaren maximalen Verschiebungsbereich erfolgte. Sowohl Gruppenzahl, Anzahl der Scans pro Gruppe und Verschiebung bei Korrelation werden im Protokoll angegeben. Zur Beseitigung von fehlerhaften Messwerten fand ein Programmteil Anwendung, in dem bei Abweichungen eines Messwertes um einen bestimmten, festlegbaren Betrag von den Werten der Umgebung, der fehlerhafte Wert durch den Mittelwert der gesamten Messung ersetzt wurde. Die überlagerten Messungen wurden anschliessend etwas geglättet, um das Photonenrauschen zu vermindern und das Spektrum übersichtlicher zu gestalten. Die Glättung erfolgte durch Faltung mit einer Gauss-Funktion, deren Breite anzugeben war.

(Vergl. die Abbildungen der Protokolle auf den Seiten 13 und 21) Die graphische Darstellung der Messwerte erfolgte so, dass das Integral über die Kurve auf 1 normiert wurde. Die Achsenbeschriftung erfolgte im richtigen Masstab mit willkürlichem Nullpunkt. (Vgl. die Abbildungen 7 und 9 auf den Seiten 14 und 22 .)

LYR023
76-07-02-00-35-00
BETA LYRAE SPEKTRUM KANAL 1 (BLAU)
PHASE 001.952

14

Abb. 7

(Gesamtspektrum Beta Lyrae mit Fehlerkurve - zu Abb.6)

Mit diesen Spektren wurden Farbtemperaturen von Beta Lyrae in den verschiedenen Phasen bestimmt. Als Vergleichsterne dabei dienten Alpha und Gamma Lyrae. Die Wahl von Gamma Lyrae wurde durch die etwa gleiche visuelle Helligkeit ($m_V = 3.25$), den ähnlichen Spektraltyp (B9 III) und die relative Nähe (scheinbarer Abstand 2.3 Grad) begründet. Um die Reduktion der gemessenen Spektren möglichst einfach zu gestalten, ist ein kleiner Abstand der zu vergleichenden Sterne am Himmel notwendig. Da auch in weiterem Abstand von Beta Lyrae kein geeigneter Stern zu finden ist, wurde Gamma Lyrae als Vergleichsterne gewählt, obwohl er (nur) in [28] als "var?" gekennzeichnet ist.

Um einen absoluten Anschluss, d. h. einen Vergleich mit einem absolut gemessenen Stern zu ermöglichen, wurde in drei Nächten zusätzlich Alpha Lyrae mit in die Messungen einbezogen. Glücklicherweise erfüllt auch Alpha Lyrae fast die gestellten Bedingungen (Spektraltyp A0 V, scheinb. Abstand 8.2 Grad). Lediglich die Helligkeit ist um einen Faktor 20 grösser. Für die Eichung wurde deshalb eine Lochblende mit 0.03 der Objektivfläche vor dem Objektiv befestigt um das Licht auf eine vergleichbare Helligkeit abzuschwächen.

(Zur Ähnlichkeit des Spektraltyps: Trotz annähernd gleichem Spektraltyp sind die Unterschiede im Einzelnen zwischen Alpha und Gamma Lyrae einerseits und Beta Lyrae andererseits sehr gross, wie man aus den im Anhang abgebildeten Spektren sofort sieht.)

Temperaturbestimmung:

Die Farbtemperatur eines Sterns ist definiert als diejenige Temperatur T_F , mit der sich die bei zwei Wellenlängen λ_1 und λ_2 beobachtete Intensitätsverteilung der Strahlung des Sterns mit Hilfe der Planck'schen Strahlungsformel

$$B_\lambda(T) \cdot C' = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \left(e^{\frac{hc}{kT\lambda}} - 1 \right)^{-1} \cdot C' =: f(\lambda) \quad (1)$$

darstellen lässt. Dabei ist vorausgesetzt, dass Sterne angenähert als Schwarze Strahler betrachtet werden können.

Ist $f(\lambda)$ die absolute Strahlungsverteilung eines Sterns, so beobachtet man mit einem Beobachtungsinstrument an der Erdoberfläche die Intensität

$$I(\lambda) = f(\lambda) \cdot a(\lambda) \cdot \xi(\lambda, t) \quad (2)$$

$a(\lambda)$ wird verursacht durch die interstellare Extinktion, $\xi(\lambda, t)$ ist ein Faktor der durch die instrumentellen Bedingungen und durch die atmosphärischen Einflüsse bestimmt ist.

Kennt man die absolute Energieverteilung der Strahlung eines Sterns, so lässt sich aus dem Intensitätsverhältnis der Strahlung bei zwei Wellenlängen λ_1 und λ_2 die Farbtemperatur direkt aus Gleichung (1) durch Iteration berechnen.

$$T_F = \frac{hc}{\lambda_1 k} \left[\ln \left(1 + \frac{f(\lambda_2)}{f(\lambda_1)} \cdot \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^5 \left(e^{\frac{hc}{kT\lambda_2}} - 1 \right) \right) \right]^{-1} \quad (3)$$

Zur Berechnung wird eine geschätzte Temperatur T in die rechte Seite der Gleichung (3) eingesetzt und eine bessere Temperatur T_F' berechnet. Diese setzt man dann statt T ein und erhält so nach einigen Wiederholungen die Farbtemperatur T_F die die Gleichung (3) erfüllt.

Die absolute Strahlungsverteilung eines Sterns erhält man durch Vergleich mit einem Eichstern (z.B. Alpha Lyrae).

Gegeben sei $f^\alpha(\lambda) \cdot a^\alpha(\lambda)$, d.h. die am Ort der Erde empfangene absolute Strahlungsverteilung von Alpha Lyrae.

Sei $f^\gamma(\lambda) \cdot a^\gamma(\lambda)$ die gesuchte Strahlungsverteilung am Ort der Erde für den Stern Gamma Lyrae.

Der Messung zugänglich ist nach (2)

$$I_o^\alpha(\lambda) = f^\alpha(\lambda) \cdot a^\alpha(\lambda) \cdot \xi_o^\alpha(\lambda, t)$$

$$I_o^\gamma(\lambda) = f^\gamma(\lambda) \cdot a^\gamma(\lambda) \cdot \xi_o^\gamma(\lambda, t)$$

Unterscheiden sich $\xi_o^\alpha(\lambda, t)$ und $\xi_o^\gamma(\lambda, t)$ nur um einen konstanten Faktor $b \neq 0$ (Blende), so gilt:

$$f^\gamma(\lambda) \cdot a^\gamma(\lambda) = I_o^\gamma(\lambda) \cdot \frac{f^\alpha(\lambda) \cdot a^\alpha(\lambda) \cdot b}{I_o^\alpha(\lambda)} \quad (4)$$

Bei weiteren Messungen (Index n) werden die Intensitäten der Sterne Gamma- und Beta Lyrae unter jeweils gleichen Bedingungen ($\xi_n^\gamma = \xi_n^\beta$) gemessen.

$$I_n^\gamma(\lambda) = f^\gamma(\lambda) \cdot a^\gamma(\lambda) \cdot \xi_n^\gamma(\lambda, t)$$

$$I_n^\beta(\lambda) = f^\beta(\lambda) \cdot a^\beta(\lambda) \cdot \xi_n^\beta(\lambda, t)$$

Daraus folgt

$$f_n^\beta(\lambda) \cdot a_n^\beta(\lambda) = I_n^\beta(\lambda) \cdot \frac{f_n^\gamma(\lambda) \cdot a_n^\gamma(\lambda)}{I_n^\gamma(\lambda)} \quad (5)$$

(4) + (5) ergeben

$$f_n^\beta(\lambda) = \frac{I_n^\beta(\lambda)}{I_n^\gamma(\lambda)} \cdot \frac{I_o^\gamma(\lambda) \cdot f^\alpha(\lambda) \cdot a^\alpha(\lambda) \cdot b}{I_o^\alpha(\lambda) \cdot a^\beta(\lambda)} \quad (6)$$

Zur Bestimmung der Farbtemperatur von Beta Lyrae aus einer Beobachtung mit Index n wird der Wert $f_n^\beta(\lambda)$ aus (6) für zwei Wellenlängen λ_1, λ_2 in (3) eingesetzt.

$$T_{F,n}^\beta = \frac{hc}{\lambda_1 k} \left[\ln \left(1 + \frac{I_n^\beta(\lambda_2) \cdot I_n^\gamma(\lambda_1)}{I_n^\gamma(\lambda_2) \cdot I_n^\beta(\lambda_1)} \cdot \frac{I_o^\gamma(\lambda_2) \cdot f^\alpha(\lambda_2) \cdot a^\alpha(\lambda_2) \cdot b \cdot I_o^\alpha(\lambda_1) \cdot a^\beta(\lambda_1)}{I_o^\gamma(\lambda_1) \cdot f^\alpha(\lambda_1) \cdot a^\alpha(\lambda_1) \cdot b \cdot I_o^\alpha(\lambda_2) \cdot a^\beta(\lambda_2)} \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^5 \left(\frac{hc}{e k T \lambda_2} - 1 \right) \right]^{-1} \quad (7)$$

Der konstante Faktor wird definiert als:

$$A^\beta := \frac{I_o^\gamma(\lambda_2) \cdot I_o^\alpha(\lambda_1) \cdot f^\alpha(\lambda_2) \cdot a^\alpha(\lambda_2) \cdot a^\beta(\lambda_1)}{I_o^\alpha(\lambda_2) \cdot I_o^\gamma(\lambda_1) \cdot f^\alpha(\lambda_1) \cdot a^\alpha(\lambda_1) \cdot a^\beta(\lambda_2)}$$

Die Bestimmung der Intensitäten bei den verschiedenen Wellenlängen in den gemessenen Spektren wurde wie folgt vorgenommen. Anhand der nicht nur gezeichneten, sondern auch numerisch ausgedruckten Spektren wurde aus der Lage der Linien $H\alpha$, $H\beta$, $H\gamma$ und He I der Nullpunkt der Wellenlängenskala des jeweiligen Spektrums bestimmt. Anschliessend wurden für Bereiche von ± 15

Messpunkten um bestimmte Wellenlängen die Mittelwerte der Intensitäten berechnet. Die Bereiche wurden nach den Gesichtspunkten von Linienfreiheit und angenähert linearem Verlauf des Spektrums in diesem Bereich ausgewählt.

Bestimmung der Farbtemperatur von Alpha Lyrae

Da in der Literatur stets nur allgemein die Farbtemperatur für A₀ V - Sterne angegeben wird und das auch nur in Spektralbereichen die ausserhalb der bei den Scannermessungen beobachteten liegen, wurde mittels der in [13] veröffentlichten absoluten Intensitäten von Alpha Lyrae die Farbtemperatur nach Gleichung (3) berechnet. Durch Mittelung der Farbtemperaturen von Wellenlängenintervallen verschiedener Länge wurden mittlere Farbtemperaturen für die benötigten Bereichskombinationen erhalten. Sie sind in Tabelle 2 mit den daraus berechneten Intensitätsverhältnissen $f^\alpha(\lambda_j) / f^\alpha(\lambda_i)$ aufgeführt.

Tabelle 2
Farbtemperaturen von Alpha Lyrae

Bereichkombination B _i / B _j	Mittlere Wellenlänge [nm]	Farbtemperatur [K]	$\frac{f^\alpha(\lambda_j)}{f^\alpha(\lambda_i)}$
B1 / B2	442.5	17700	0.7511
B1 / B3	465.0	17500	0.5740
B1 / B4	485.0	17500	0.4566
B1 / B5	512.5	17700	0.3374
B1 / B6	525.0	17900	0.2948
B1 / B7	545.0	17900	0.2412
B2 / B3	487.5	17500	0.7630
B2 / B4	507.5	17600	0.6063
B2 / B5	535.0	17900	0.4477
B2 / B6	547.5	17900	0.3931
B2 / B7	567.5	17600	0.3238
B3 / B4	530.0	17900	0.7940
B3 / B5	557.5	17800	0.5889
B3 / B6	570.0	17500	0.5191
B3 / B7	590.0	16800	0.4303
B4 / B5	577.5	17200	0.7438
B4 / B6	590.0	16800	0.6563
B4 / B7	610.0	16300	0.5423
B5 / B6	617.5	16200	0.8815
B5 / B7	637.5	15700	0.7279
B6 / B7	650.0	15300	0.8259
R1 / R2	577.5	17200	0.7049
R1 / R3	612.5	16300	0.5032
R2 / R3	645.0	15400	0.7137

Berechnung der Farbtemperatur von Gamma Lyrae

Aus Gleichung (3) in Verbindung mit Gleichung (4) lässt sich die Farbtemperatur von Gamma Lyrae berechnen, wenn das Verhältnis $a^\alpha(\lambda) / a^\delta(\lambda)$ der interstellaren Extinktion bekannt ist. Dieses Verhältnis wurde mit den Werten der interstellaren Extinktion berechnet, die in [10] für die Cygnus-Region angegeben sind. Obwohl Alpha, Beta und Gamma Lyrae nicht mehr genau in der Galaktischen Ebene liegen, wurde in Ermangelung eines besseren Wertes der Wert für die benachbarte Cygnus-Region als gültig angenommen. Die zur Berechnung von $a^\delta(\lambda)$ notwendige Entfernung von Gamma Lyrae musste, da keine Literaturwerte vorliegen, aus dem Farbexzess abgeleitet werden.

Berechnet man für Gamma Lyrae aus dem Farbexzess $E_{B-V} = +0.026$ die Absorption im visuellen Spektralbereich nach [10] mit

$$A_V = 3.2 E_{B-V} \quad (8)$$

so ergibt sich

$$A_V = 0.08$$

Damit und mit einer absoluten Helligkeit für B9 III - Sterne von $M_V = -0.4$, ergibt sich aus dem Entfernungsmodul

$$m_V - M_V - A_V = -5 + 5 \log r \quad (9)$$

die Entfernung von Gamma Lyrae zu

$$r_\delta = 51.7 \text{ pc}$$

Für Alpha Lyrae wurde der Wert

$$r_\alpha = 8.13 \text{ pc}$$

nach [16, S. 69] angenommen.

Damit lässt sich nun für Gamma Lyrae die Farbtemperatur

$$T_F^\delta = \frac{hc}{\lambda_1 k} \left[\ln \left(1 + \frac{I_0^\delta(\lambda_2) f^\alpha(\lambda_2) a^\alpha(\lambda_2) b I_0^\alpha(\lambda_1) a^\delta(\lambda_1)}{I_0^\delta(\lambda_1) f^\alpha(\lambda_1) a^\alpha(\lambda_1) b I_0^\alpha(\lambda_2) a^\delta(\lambda_2)} \right) \cdot \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^5 \cdot \left(e^{\frac{hc}{kT\lambda_2}} - 1 \right) \right]^{-1} \quad (7a)$$

$$A^\delta := \frac{I_0^\delta(\lambda_2) \cdot I_0^\alpha(\lambda_1) \cdot f^\alpha(\lambda_2) \cdot a^\alpha(\lambda_2) \cdot a^\delta(\lambda_1)}{I_0^\delta(\lambda_1) \cdot I_0^\alpha(\lambda_2) \cdot f^\alpha(\lambda_1) \cdot a^\alpha(\lambda_1) \cdot a^\delta(\lambda_2)}$$

bestimmen.

Die für Gleichung (7a) notwendigen Intensitäten $I_0^\delta(\lambda)$ und $I_0^\alpha(\lambda)$ wurden aus den Messungen LYRo40/LYRo41, LYRo68 und LYRo72/LYRo73 bestimmt. Die Messung LYRo68, bei der zwischen den Messungen von Alpha und Gamma Lyrae nur ein Zenitdistanzunterschied von 1 Grad bestand, konnte unverändert verwendet werden. Die beiden Messreihen LYRo40/LYRo41 und LYRo72/LYRo73 waren nur bedingt brauchbar. Bei LYRo40/LYRo41 war der Fokus des Fernrohres verstellt und ebenso wie bei LYRo72/LYRo73 war die Differenz in der Zenitdistanz zwischen den jeweiligen Messungen mit ~ 10 Grad schon so gross, dass der Einfluss der atmosphärischen Extinktion nicht

mehr vernachlässigbar war. Da die Extinktionskoeffizienten der jeweiligen Nacht nicht bekannt waren, wurden mittlere Koeffizienten verwendet die sich aus [18] und den Messungen von M. Gottwald ergaben. Die mit den so reduzierten Intensitäten berechneten Farbtemperaturen von Gamma Lyrae streuten sehr stark, so dass, wie bei der Berechnung der Temperatur von Alpha Lyrae, auch hier ein mittlerer Verlauf der Farbtemperaturkurve über den verwendeten Wellenlängenbereich ermittelt wurde. Die Streuung der Werte hat verschiedene Ursachen. Bei Berechnung der Temperatur aus Bereichen die nahe beieinander liegen (Bereichnummerunterschied 1 oder 2), wirkt sich die Ungenauigkeit der $I_0(\lambda)$ stark aus; bei Bereichskombinationen mit zu grossem Abstand wird die Abweichung der Sternstrahlung vom Schwarzen Körper merklich. Unter diesen Gesichtspunkten wurde eine mittlere Farbtemperaturkurve für Gamma Lyrae abgeleitet. Diese Temperaturen sind in Tabelle 3 mit den daraus abgeleiteten A^δ und A^β aufgeführt. Alle Berechnungen der Farbtemperatur von Beta Lyrae sind mit diesen Werten ausgeführt.

Tabelle 3
(Farbtemperatur Gamma Lyrae, A^δ , A^β)

Bereich- kombination B_i/B_j	T_F^δ [K]	A^δ	A^β
B1/B2	15900 ± 5100	0.764 ± 0.029	0.711 ± 0.030
B1/B3	17300 ± 5800	0.576 ± 0.037	0.495 ± 0.040
B1/B4	18100 ± 5700	0.451 ± 0.035	0.360 ± 0.040
B1/B5	18100 ± 4800	0.334 ± 0.029	0.239 ± 0.030
B1/B6	17900 ± 4300	0.295 ± 0.024	0.204 ± 0.025
B1/B7	17500 ± 3500	0.244 ± 0.021	0.162 ± 0.020
B2/B3	18200 ± 5800	0.760 ± 0.020	0.702 ± 0.020
B2/B4	18200 ± 5100	0.602 ± 0.024	0.522 ± 0.025
B2/B5	17700 ± 3900	0.449 ± 0.023	0.345 ± 0.025
B2/B6	17500 ± 3500	0.396 ± 0.021	0.295 ± 0.020
B2/B7	16900 ± 3300	0.330 ± 0.021	0.282 ± 0.020
B3/B4	17800 ± 4100	0.794 ± 0.012	0.744 ± 0.015
B3/B5	17200 ± 3300	0.593 ± 0.017	0.493 ± 0.020
B3/B6	16900 ± 3300	0.523 ± 0.019	0.422 ± 0.020
B3/B7	15800 ± 4100	0.438 ± 0.027	0.338 ± 0.030
B4/B5	16500 ± 3600	0.747 ± 0.014	0.663 ± 0.015
B4/B6	15800 ± 4100	0.662 ± 0.020	0.569 ± 0.020
B4/B7	14700 ± 5000	0.555 ± 0.031	0.457 ± 0.030
B5/B6	14200 ± 5400	0.887 ± 0.012	0.860 ± 0.015
B5/B7	12900 ± 6300	0.745 ± 0.031	0.692 ± 0.030
B6/B7	12100 ± 7000	0.841 ± 0.025	0.805 ± 0.030
R1/R2	19500 ± 4300	0.695 ± 0.012	0.617 ± 0.015
R1/R3	14100 ± 4500	0.522 ± 0.033	0.429 ± 0.035
R2/R3	15300 ± 4800	0.714 ± 0.019	0.661 ± 0.020

Bestimmung der Farbtemperatur von Beta Lyrae

Das zu Berechnung der Farbtemperatur von Beta Lyrae nach Gleichung (7) notwendige Verhältnis $a^\alpha(\lambda) / a^\beta(\lambda)$ wurde ebenfalls mit den Werten der interstellaren Extinktion berechnet, die in [10] für die Cygnus-Region angegeben sind. Die Entfernung von Beta Lyrae beträgt nach [1] 260 pc. Die daraus und aus den Werten von A^α berechneten Werte A^β , sind in der Tabelle 3 auf Seite 19 aufgeführt.

Die zu Gültigkeit der Gleichung (5) notwendige Bedingung $\varepsilon_n^\alpha = \varepsilon_n^\beta$ wurde dadurch erfüllt, dass die Beobachtung des Spektrums von Beta Lyrae stets unmittelbar auf Beobachtungen des Spektrums von Gamma Lyrae folgten. Der maximale Zeitunterschied betrug 20 Minuten. Dadurch wurde erreicht, dass fast in der gleichen Richtung mit nahezu gleicher Zenitdistanz gemessen wurde. (Für eine mittlere Zenitdistanz von 35 Grad und einen mittleren Zenitdistanzunterschied von 4 Grad, ergibt sich bei ungünstigstem Extinktionskoeffizienten und ungünstigster Bereichkombination ein Unterschied von etwa 1% in ε .) Der Einfluss der atmosphärischen Extinktion war daher stets vernachlässigbar klein und es gilt

$$\varepsilon_n^\alpha \approx \varepsilon_n^\beta \quad .$$

Die Auswerteprotokolle für die Spektren und die berechneten Temperaturen sind im Anhang mit den dazugehörigen Spektren abgebildet.

3.2.2 Auswertung der Linienmessungen - Äquivalentbreitenbestimmung

Ein Linienscan in einer Richtung besteht aus 128 Messpunkten und dauert etwa 8 Sekunden. Einem Messpunkt entspricht ein Bereich von ca. 0,18 nm.

Bis auf wenige Ausnahmen wurden die Linienscans stets unkorreliert überlagert, da eine Korrelation, wie die Erfahrung zeigte, nicht nötig war. Da während einer Messung bis zu 160 Linienscans erhalten wurden, erfolgte eine Aufteilung in drei Gruppen, so dass etwa alle 5 Minuten die Äquivalentbreite als der Mittelwert über diese Zeit bestimmt wurde.

Das für die Berechnung der Äquivalentbreiten vorhandene Programm von R. Schoembs konnte unverändert nur für die Bestimmung der Äquivalentbreite W_λ von H α angewendet werden. Dieses Programm berechnet W_λ auf drei verschiedene Arten, von denen jedoch nur eine verwendet wurde, die nun kurz beschrieben wird.

Zuerst wird aus drei einzugebenden Messpunkten (Kontinuumsanfang vor der Linie KA - Kontinuumsende vor der Linie = Linienanfang LA - Linienende LE) die Differenz LA - KA berechnet und am Ende der Linie ein zweiter Kontinuumsbereich definiert: LE bis LE + (LA - KA). Aus diesen beiden Kontinuumsbereichen wird das Kontinuum in der Linie durch Interpolation berechnet, um die Bestimmung der Fläche zwischen Linie und Kontinuum zu ermöglichen. Die Breite einer gleich grossen Fläche mit Höhe des Kontinuums im Linienzentrum ist als Äquivalentbreite W_λ definiert.

Als Beispiel für eine Äquivalentbreitenberechnung ist in den Abbildungen 8 und 9 auf den Seiten 21 und 22 das Protokoll und die Zeichnung einer Linie wiedergegeben.

Abb. 9

(Zeichnung zum Rechnerprotokoll Abb. 8 Seite 21 mit den sonst weggelassenen Fehlerkurven)

Wie schon angedeutet konnte die oben beschriebene Berechnung von W_λ nur im Fall von $H\alpha$ erfolgen, da in dem benötigten Bereich um $H\alpha$ sonst keine Linien auftraten und so das Kontinuum problemlos zu berechnen war. (Vgl. Abb. 10)

Abb. 10

In den Fällen der beiden anderen Linien $H\epsilon$ I und $H\epsilon$ II jedoch war es nicht möglich die Kontinuumsbereiche direkt an die Linie angrenzen zu lassen. Bei $H\epsilon$ I z.B. war die starke, durch die interstellaren Na I - D Linien (589.0 nm und 589.6 nm) verursachte Absorption, zu berücksichtigen. (Vgl. Abb. 11)

Abb. 11

Bei $H\beta$ sollten die wechselnd auftretenden Absorptions- und Emissionslinien, die sehr komplex waren, für jede Messung einzeln berücksichtigt werden. Da hier immer wieder an verschiedenen Stellen Linien auftraten (vgl. z.B. Abb. 12 und 13), wurde

Abb. 12

Abb. 13

über eine Statistik der auftretenden Linien (Abb. 14 Seite 25) und an Hand photographischer Spektren versucht, Bereiche mit ungestörtem Kontinuum zu finden. In der Literatur waren keine

Abbildungen des Bereichs um $H\beta$ zu finden und so musste auf Spektren zurückgegriffen werden, die vor einiger Zeit an der Sternwarte Bonn (Hoher List) aufgenommen worden waren. Ausserdem wurden freundlicherweise von M. Hack die zu der Arbeit [4] verwendeten Registrierkurven der entsprechenden Spektren zur Verfügung gestellt. Zusätzlich konnten auch noch Kontaktabzüge der obigen Spektren erhalten werden.

Abb. 14

(Statistik der um $H\beta$ auftretenden Emissions- und Absorptionslinien)

Um nun die Wahl der Kontinuumsbereiche zu ermöglichen, wurde das Programm so verändert, dass die Kontinuumsbereiche unabhängig von den Liniengrenzen gewählt werden können. Damit wurden dann die Äquivalentbreiten von $H\beta$ und He I bestimmt.

3.3 Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Messergebnisse aufgeführt und beschrieben, aber noch nicht diskutiert, was erst in Abschnitt 5 geschieht.

3.3.1 Liste der berechneten Äquivalentbreiten und Farbtemperaturen

Die Spalten der Tabelle 4 haben von links nach rechts folgende Bedeutung:

- 1: Kennzeichen der Messung
- 2: Julianisches Datum mit Tagesbruchteilen für Beobachtungsmitte
- 3: Epoche
- 4: Ausgewertete Linie oder Kanal
- 5: Mittelwert der Äquivalentbreiten der Gruppen einer Messung in Nanometer und mittlerer Fehler oder "mittlere" Temperatur in Kelvin für die Wellenlängenbereiche 420 nm bis 630 nm (Kanal 1 - blau) bzw. 545 nm bis 680 nm (Kanal 2 - rot) und mittlerer Fehler
- 6: relativer Fehler in %

Tabelle 4

Kennz.	Julianisches Datum	Epoche	Linie/ Kanal	Äquiv.-Breite/ Temperatur	relat. Fehler
LYR001	2442939.441	00.247	Kanal 1 Kanal 2		
LYR002	939.503	00.252	H α H β	-1.4565 $\pm$ 0.0151 -	1.0 -
LYR003	944.510	00.639	Kanal 1 Kanal 2		
LYR004	944.563	00.643	H α H β	-1.8213 $\pm$ 0.0233 -	1.3 -
LYR005	947.417	00.864	Kanal 1 Kanal 2		
LYR006	947.458	00.867	H α H β	-1.6675 $\pm$ 0.0377 -0.1350 $\pm$ 0.0215	2.3 15.9
LYR007	947.486	00.869	H α H β	-1.7087 $\pm$ 0.0089 -0.1468 $\pm$ 0.0098	0.5 6.7
LYR008	947.510	00.871	Kanal 1 Kanal 2		
LYR009	951.410	01.172	Kanal 1 Kanal 2		
LYR010	951.431	01.174	H α H β	-1.5748 $\pm$ 0.0477 -0.1302 $\pm$ 0.0031	3.0 2.4
LYR011	952.490	01.256	Kanal 1 Kanal 2		
LYR012	952.514	01.258	H α H β	-1.4565 $\pm$ 0.0179 -0.0999 $\pm$ 0.0037	1.2 3.7
LYR013	952.538	01.260	Kanal 1 Kanal 2		

Tabelle 4 Forts.

Kennz.	Julianisches Datum	Epoche	Linie/ Kanal	Äquiv.-Breite/ Temperatur	relat. Fehler
LYRo14	2442952.563	01.262	H α	-1.4148 $\pm$ 0.0460	3.7
			H β	-0.0935 $\pm$ 0.0078	8.4
LYRo15	957.469	01.641	Kanal 1		
			Kanal 2		
LYRo16	957.521	01.645	H α	-1.6321 $\pm$ 0.0393	2.4
			H β	-0.1634 $\pm$ 0.0143	8.7
LYRo17	957.542	01.647	Kanal 1		
			Kanal 2		
LYRo18	957.562	01.648	H α	-1.6675 $\pm$ 0.0091	0.5
			H β	-0.1586 $\pm$ 0.0035	2.2
LYRo19	960.375	01.866	Kanal 1	19000 $\pm$ 6700	35.3
			Kanal 2	16100 $\pm$ 4300	26.7
LYRo20	960.403	01.868	H α	-1.5363 $\pm$ 0.0242	1.6
			H β	-0.0881 $\pm$ 0.0077	8.7
LYRo21	960.510	01.876	Kanal 1	28700 $\pm$ 11500	40.1
			Kanal 2	19700 $\pm$ 5500	27.9
LYRo22	960.531	01.877	H α	-1.5941 $\pm$ 0.0532	3.3
			H β	-0.0982 $\pm$ 0.0041	4.2
LYRo23	961.500	01.953	Kanal 1	27200 $\pm$ 7000	25.7
			Kanal 2	18600 $\pm$ 5300	28.5
LYRo24	961.549	01.956	H α	-2.6128 $\pm$ 0.0805	3.1
			H β	-0.2962 $\pm$ 0.0086	2.9
LYRo25	966.389	02.331	Kanal 1	24900 $\pm$ 11800	47.4
			Kanal 2	35900 $\pm$ 10400	29.0
LYRo26	966.420	02.333	H α	-1.5550 $\pm$ 0.0538	3.5
			H β	-0.1302 $\pm$ 0.0055	4.2
LYRo27	966.444	02.335	He I	-0.4855 $\pm$ 0.0136	2.8
			He I +A	-0.3957 $\pm$ 0.0394	9.9
LYRo28	966.486	02.338	Kanal 1	18700 $\pm$ 7200	38.5
			Kanal 2	11800 $\pm$ 2500	21.2
LYRo29	966.521	02.341	H α	-1.4729 $\pm$ 0.0254	1.7
			H β	-0.1286 $\pm$ 0.0051	4.0
LYRo30	966.549	02.343	He I	-0.5116 $\pm$ 0.0277	5.4
			He I +A	-0.4292 $\pm$ 0.0246	5.7
LYRo31	971.410	02.719	Kanal 1	33700 $\pm$ 8800	26.1
			Kanal 2	29100 $\pm$ 8600	29.6
LYRo32	971.434	02.721	H α	-1.4818 $\pm$ 0.0236	1.6
			H β	-0.1293 $\pm$ 0.0028	2.2
LYRo33	971.458	02.723	He I	-0.5571 $\pm$ 0.0175	3.1
			He I +A	-0.4896 $\pm$ 0.0201	4.1
LYRo34	971.500	02.726	Kanal 1	21600 $\pm$ 12300	56.9
			Kanal 2	15600 $\pm$ 4300	27.6
LYRo35	971.521	02.727	H α	-1.5194 $\pm$ 0.0252	1.7
			H β	-0.1259 $\pm$ 0.0099	7.9
LYRo36	971.542	02.729	He I	-0.5656 $\pm$ 0.0137	3.0
			He I +A	-0.4366 $\pm$ 0.0352	8.1
LYRo37	976.385	03.104	Kanal 1	32500 $\pm$ 10100	31.1
			Kanal 2	24500 $\pm$ 20100	82.0
LYRo38	976.410	03.106	H α	-1.7648 $\pm$ 0.0102	0.6
			H β	-0.1335 $\pm$ 0.0109	8.1
LYRo39	976.437	03.108	He I	-0.4155 $\pm$ 0.0155	3.7
			He I +A	-0.1669 $\pm$ 0.0185	11.1
LYRo41	976.531	03.115	Kanal 1	19800 $\pm$ 7100	35.9
			Kanal 2	19300 $\pm$ 10700	55.4

Tabelle 4 Forts.

Kennz.	Julianisches Datum	Epoche	Linie/ Kanal	Äquiv.-Breite/ Temperatur	relat. Fehler
LYRo42	2442976.552	03.117	H α	-1.6576 $\pm$ 0.0283	1.7
			H β	-0.1144 $\pm$ 0.0067	5.9
LYRo43	976.576	03.118	He I	-0.4125 $\pm$ 0.0230	5.6
			He I +A	-0.1665 $\pm$ 0.0478	28.7
LYRo44	978.459	03.264	Kanal 1	43500 $\pm$ 13900	32.0
			Kanal 2	26100 $\pm$ 11500	44.1
LYRo45	2443029.368	07.200	Kanal 1	-	-
			Kanal 2	-	-
LYRo46	029.392	07.202	H α	-1.4291 $\pm$ 0.0402	2.8
			H β	-0.0888 $\pm$ 0.0032	3.6
LYRo47	029.417	07.204	He I	-0.3772 $\pm$ 0.0269	7.1
			He I +A	-0.2542 $\pm$ 0.0402	15.8
LYRo48	029.451	07.207	Kanal 1	50300 $\pm$ 17600	35.0
			Kanal 2	22600 $\pm$ 500	2.2
LYRo49	029.479	07.209	H α	-1.6451 $\pm$ 0.0407	2.5
			H β	-0.0930 $\pm$ 0.0125	13.4
LYRo50	029.524	07.213	He I	-0.4069 $\pm$ 0.0094	2.8
			He I +A	-0.3957 $\pm$ 0.0394	9.9
LYRo51	044.319	08.357	Kanal 1	22300 $\pm$ 6500	29.1
			Kanal 2	22600 $\pm$ 11400	50.4
LYRo54	044.406	08.363	Kanal 1	25100 $\pm$ 9000	35.9
			Kanal 2	24500 $\pm$ 4800	19.6
LYRo55	044.427	08.365	H α	-1.2665 $\pm$ 0.0655	5.2
			H β	-0.0958 $\pm$ 0.0140	14.6
LYRo56	044.448	08.366	He I	-0.458 $\pm$ 0.066	1.4
			He I +A	-0.3278 $\pm$ 0.0356	10.9
LYRo57	044.490	08.370	Kanal 1	16200 $\pm$ 4600	28.4
			Kanal 2	13900 $\pm$ 7900	56.8
LYRo58	044.510	08.371	H α	-1.3188	2.0
			H β	-0.0828	2.0
LYRo59	045.389	08.439	Kanal 1	19900 $\pm$ 10200	51.3
			Kanal 2	14900 $\pm$ 4800	32.2
LYRo60	045.413	08.441	H α	-1.6887 $\pm$ 0.0696	4.1
			H β	-0.1385 $\pm$ 0.0129	9.3
LYRo61	045.434	08.443	He I	-0.6446 $\pm$ 0.0552	8.6
			He I +A	-0.5223 $\pm$ 0.0255	4.9
LYRo62	046.347	08.513	Kanal 1	30300 $\pm$ 12200	40.3
			Kanal 2	12900 $\pm$ 9400	72.9
LYRo63	046.365	08.515	H α	-1.7602 $\pm$ 0.0228	1.3
			H β	-0.1629 $\pm$ 0.0029	5.7
LYRo64	046.385	08.516	He I	-0.7167 $\pm$ 0.0052	0.7
			He I +A	-0.6912 $\pm$ 0.0085	1.2
LYRo65	078.260	10.981	Kanal 1	19300 $\pm$ 12700	65.8
			Kanal 2	8000 $\pm$ 1200	15.0
LYRo66	078.281	10.983	H α	-3.4799 $\pm$ 0.0608	1.7
			H β	-0.5281 $\pm$ 0.0092	1.7
LYRo67	078.302	10.984	He I	-1.1101 $\pm$ 0.0391	3.5
			He I +A	-0.8481 $\pm$ 0.0313	3.5
LYRo69	078.403	10.992	Kanal 1	11200 $\pm$ 2100	18.8
			Kanal 2	16800 $\pm$ 9300	55.4
LYRo70	078.424	10.994	H α	-3.5259 $\pm$ 0.1859	5.2
			H β	-0.6377 $\pm$ 0.0422	6.6
LYRo71	078.444	10.995	He I	-1.1180 $\pm$ 0.0907	8.1
			He I +A	-0.7922 $\pm$ 0.1218	15.4

Tabelle 4 Forts.

Kennz.	Julianisches Datum	Epoche	Linie/ Kanal	Äquiv.-Breite/ Temperatur	relat. Fehler
LYRo75	2443289.396	27.308	Kanal 1	-	-
			Kanal 2	8000 ± 4900	61.3
LYRo76	289.434	27.310	H α	-1.2504 ± 0.1025	8.2
			H β	-0.1445 ± 0.0031	2.1
LYRo77	289.455	27.311	He I	-0.3391 ± 0.0438	12.9
			He I +A	-0.2797 ± 0.0289	10.4
LYRo78	296.479	27.854	Kanal 1	-	-
			Kanal 2	-	-
LYRo79	296.493	27.856	H α	-1.3710 ± 0.0419	3.1
			H β	-0.0894 ± 0.0085	9.5
LYRo80	296.514	27.857	He I	-0.4017 ± 0.0362	9.0
			He I +A	-0.2859 ± 0.0628	21.9
LYRo81	2443307.392	31.018	Kanal 1	29300 ± 8000	27.3
			Kanal 2	11300 ± 1800	15.9
LYRo82	307.406	31.019	H α	-3.7343 ± 0.0334	0.9
			H β	-0.5523 ± 0.0137	2.5
LYRo83	307.431	31.021	He I	-1.0316 ± 0.0167	1.6
			He I +A	-0.9181	0.7
LYRo84	307.462	31.023	Kanal 1	27200 ± 4700	17.3
			Kanal 2	19500 ± 6400	32.8
LYRo85	317.396	31.791	Kanal 1	18200 ± 8000	44.0
			Kanal 2	15300 ± 6000	39.2
LYRo86	317.413	31.793	H α	-1.3334	3.0
			H β	-0.1008	1.0
LYRo87	317.438	31.795	He I	-0.3813 ± 0.0452	12.0
			He I +A	-0.2822 ± 0.0635	22.5
SPA001	2442470.613	-37.999	H α	-3.4382	3.9
			H β	-0.6628	6.4
SPA002	471.590	-36.075	H α	-3.2124	1.9
			H β	-0.5682	5.4
SPA003	473.626	-36.155	H α	-1.8046	5.9
			H β	-0.2215	16.7
SPA004	479.599	-36.616	H α	-1.9405	6.8
			H β	-0.2625	9.0

3.3.2 Graphische Darstellung der Messresultate (3.3.1)

a) Verteilung der Messungen über die Phase:

 $H\alpha, H\beta$:

He I:

SPEKTREN:

- b) Variation der Farbtemperaturen:
Die Abbildungen 15 , 16 und 17 auf den Seiten 31 und 32 zeigen die Variation der Farbtemperatur in ausgewählten Bereichskombinationen und die mittlere Farbtemperatur wie sie in Tabelle 4 (und 5) aufgeführt ist.
- c) $H\alpha$ - Äquivalentbreiten:
Tabelle 6 Seite 33 und Abbildung 18 Seite 34
- d) $H\beta$ - Äquivalentbreiten:
Tabelle 7 Seite 35 und Abbildung 19 Seite 36
- e) He I - Äquivalentbreiten:
Tabelle 8 , 8a Seite 37 und Abbildung 20 Seite 38
- f) Darstellung der Variationen von $H\alpha$, $H\beta$ und He I in einem Diagramm:
Abbildung 21 Seite 39 .

Abb. 15

Abb. 16

Tabelle 5
(Mittlere Farbtemperaturen Beta Lyrae
nach Phasen geordnet)

Epoche	Kennz.	$\bar{T}_F$ (blau) [K]	relat. Fehler	$\bar{T}_F$ (rot) [K]	relat. Fehler
31.018	LYRo81	29300 ± 8000	27.3 %	11300 ± 1800	15.9 %
31.023	LYRo84	27200 ± 4700	17.3 %	19500 ± 6400	32.8 %
03.104	LYRo37	32500 ± 10100	31.1 %	24500 ± 20100	82.0 %
03.115	LYRo41	19800 ± 7100	35.9 %	19300 ± 10700	55.4 %
07.207	LYRo48	50300 ± 17600	35.0 %	22600 ± 500	2.2 %
03.264	LYRo44	43500 ± 13900	32.0 %	26100 ± 11500	44.1 %
27.308	LYRo75	-	-	8000 ± 4900	61.3 %
02.331	LYRo25	24900 ± 11800	47.4 %	35900 ± 10400	29.0 %
02.338	LYRo28	18700 ± 7200	38.5 %	11800 ± 2500	21.2 %
08.357	LYRo51	22300 ± 6500	29.1 %	22600 ± 11400	50.4 %
08.363	LYRo54	25100 ± 9000	35.9 %	24500 ± 4800	19.6 %
08.370	LYRo57	16200 ± 4600	28.4 %	13900 ± 7900	56.8 %
08.439	LYRo59	19900 ± 10200	51.3 %	14900 ± 4800	32.2 %
08.513	LYRo62	30300 ± 12200	40.3 %	12900 ± 9400	72.9 %
02.719	LYRo31	33700 ± 8800	26.1 %	29100 ± 8600	29.6 %
02.726	LYRo34	21600 ± 12300	56.9 %	15600 ± 4300	27.6 %
31.791	LYRo85	18200 ± 8000	44.0 %	15300 ± 6000	39.2 %
01.866	A/o19	19000 ± 6700	35.3 %	16100 ± 4300	26.7 %
01.876	A/o21	28700 ± 11500	40.1 %	19700 ± 5500	27.9 %
01.953	C/o23	27200 ± 7000	25.7 %	18600 ± 5300	28.5 %
10.981	LYRo65	19300 ± 12700	65.8 %	8000 ± 1200	15.0 %
10.992	LYRo69	11200 ± 2100	18.8 %	16800 ± 9300	55.4 %

Abb. 17

Tabelle 6

Äquivalentbreiten von H α
nach Phase geordnet

Epoche	Kennz.	Äquivalentbreite [nm]	relat. Fehler
31.019	LYRo82	-3.7343 $\pm$ 0.0334	0.9 %
-36.075	SPA002	-3.2124 $\pm$ 0.0578	1.8 %
03.106	LYRo38	-1.7648 $\pm$ 0.0102	0.6 %
03.117	LYRo42	-1.6576 $\pm$ 0.0283	1.7 %
-36.155	SPA003	-1.8046 $\pm$ 0.1065	5.9 %
01.174	LYRo10	-1.5748 $\pm$ 0.0477	3.0 %
07.202	LYRo46	-1.4291 $\pm$ 0.0402	2.8 %
07.209	LYRo49	-1.6451 $\pm$ 0.0407	2.5 %
00.252	LYRo02	-1.4565 $\pm$ 0.0151	1.0 %
01.258	LYRo12	-1.4565 $\pm$ 0.0179	1.2 %
01.262	LYRo14	-1.4148 $\pm$ 0.0460	3.2 %
27.310	LYRo76	-1.2504 $\pm$ 0.1025	8.2 %
02.333	LYRo26	-1.5550 $\pm$ 0.0538	3.5 %
02.341	LYRo29	-1.4729 $\pm$ 0.0254	1.7 %
08.365	LYRo55	-1.2665 $\pm$ 0.0655	5.2 %
08.371	LYRo58	-1.3188 $\pm$ 0.0264	2.0 %
08.441	LYRo60	-1.6881 $\pm$ 0.0696	4.1 %
08.515	LYRo63	-1.7602 $\pm$ 0.0228	1.3 %
-36.616	SPA004	-1.9405 $\pm$ 0.1320	6.8 %
00.643	LYRo04	-1.8213 $\pm$ 0.0233	1.3 %
01.645	LYRo16	-1.6321 $\pm$ 0.0393	2.4 %
01.648	LYRo18	-1.6675 $\pm$ 0.0091	0.5 %
02.721	LYRo32	-1.4818 $\pm$ 0.0236	1.6 %
02.727	LYRo35	-1.5194 $\pm$ 0.0252	1.7 %
31.793	LYRo86	-1.3334 $\pm$ 0.0400	3.0 %
27.856	LYRo79	-1.3710 $\pm$ 0.0419	3.1 %
00.866	LYRo06	-1.6675 $\pm$ 0.0377	2.3 %
01.868	LYRo20	-1.5363 $\pm$ 0.0242	1.6 %
00.869	LYRo07	-1.7087 $\pm$ 0.0089	0.5 %
01.877	LYRo22	-1.5941 $\pm$ 0.0532	3.3 %
01.956	LYRo24	-2.6128 $\pm$ 0.0805	3.1 %
10.983	LYRo66	-3.4799 $\pm$ 0.0608	1.7 %
10.994	LYRo70	-3.5259 $\pm$ 0.1859	5.2 %
-37.999	SPA001	-3.4375 $\pm$ 0.1478	4.3 %

(Vergleiche Abbildung 18 Seite 34)

Tabelle 7

Äquivalentbreiten von H β
nach Phase geordnet

Epoche	Kennz.	Äquivalentbreite [nm]	relat. Fehler
31.019	LYRo82	-0.5523 $\pm$ 0.0137	2.5 %
-36.075	SPA002	-0.5682 $\pm$ 0.0307	5.4 %
03.106	LYRo38	-0.1335 $\pm$ 0.0109	8.1 %
03.117	LYRo42	-0.1144 $\pm$ 0.0067	5.9 %
-36.155	SPA003	-0.2215 $\pm$ 0.0370	16.7 %
01.174	LYRo10	-0.1302 $\pm$ 0.0031	2.4 %
07.202	LYRo46	-0.0888 $\pm$ 0.0032	3.6 %
07.209	LYRo49	-0.0930 $\pm$ 0.0125	13.4 %
01.258	LYRo12	-0.0999 $\pm$ 0.0037	3.7 %
01.262	LYRo14	-0.0935 $\pm$ 0.0078	8.4 %
27.310	LYRo76	-0.1445 $\pm$ 0.0031	2.1 %
02.333	LYRo26	-0.1302 $\pm$ 0.0055	4.2 %
02.341	LYRo29	-0.1287 $\pm$ 0.0051	4.0 %
08.365	LYRo55	-0.0958 $\pm$ 0.0140	14.6 %
08.371	LYRo58	-0.0828 $\pm$ 0.0017	2.0 %
08.441	LYRo60	-0.1385 $\pm$ 0.0129	9.3 %
08.515	LYRo63	-0.1629 $\pm$ 0.0029	5.7 %
-36.616	SPA004	-0.2625 $\pm$ 0.0236	9.0 %
01.645	LYRo16	-0.1634 $\pm$ 0.0143	8.7 %
01.648	LYRo18	-0.1586 $\pm$ 0.0035	2.2 %
02.721	LYRo32	-0.1293 $\pm$ 0.0028	2.2 %
02.727	LYRo35	-0.1259 $\pm$ 0.0099	7.9 %
31.793	LYRo86	-0.1008 $\pm$ 0.0030	3.0 %
27.856	LYRo79	-0.0894 $\pm$ 0.0085	9.5 %
00.866	LYRo06	-0.1350 $\pm$ 0.0215	15.9 %
01.868	LYRo20	-0.0881 $\pm$ 0.0077	8.7 %
00.869	LYRo07	-0.1468 $\pm$ 0.0098	6.7 %
01.877	LYRo22	-0.0982 $\pm$ 0.0041	4.2 %
01.956	LYRo24	-0.2963 $\pm$ 0.0086	2.9 %
10.983	LYRo66	-0.5281 $\pm$ 0.0092	1.7 %
10.994	LYRo70	-0.6377 $\pm$ 0.0422	6.6 %
-37.999	SPA001	-0.6628 $\pm$ 0.0057	6.4 %

(Vergleiche Abbildung 19 auf Seite 36)

Abb. 19
(H β - Äquivalentbreiten)

Tabelle 8

Äquivalentbreiten von He I
nach Phase geordnet

Epoche	Kennz.	Äquivalentbreite (korrigiert) [nm]	relat. Fehler	Äquivalentbreite mit Absorption [nm]	relat. Fehler
31.021	LYRo83	-1.0316 ± 0.0167	1.6 %	-0.9181 ± 0.0064	0.7 %
03.108	LYRo39	-0.4155 ± 0.0155	3.7 %	-0.1669 ± 0.0185	11.1 %
03.118	LYRo43	-0.4125 ± 0.0230	5.6 %	-0.1665 ± 0.0478	28.7 %
07.204	LYRo47	-0.3772 ± 0.0269	7.1 %	-0.2542 ± 0.0402	15.8 %
07.213	LYRo50	-0.4069 ± 0.0094	2.3 %	-0.3028 ± 0.0086	2.9 %
27.311	LYRo77	-0.3391 ± 0.0438	12.9 %	-0.2797 ± 0.0289	10.4 %
02.335	LYRo27	-0.4855 ± 0.0136	2.8 %	-0.3957 ± 0.0394	9.9 %
02.343	LYRo30	-0.5116 ± 0.0277	5.4 %	-0.4292 ± 0.0246	5.7 %
08.366	LYRo56	-0.4578 ± 0.0660	1.4 %	-0.3278 ± 0.0356	10.9 %
08.443	LYRo61	-0.6446 ± 0.0552	8.6 %	-0.5223 ± 0.0255	4.9 %
08.516	LYRo64	-0.7167 ± 0.0052	0.7 %	-0.6912 ± 0.0085	1.2 %
02.723	LYRo33	-0.5571 ± 0.0175	3.1 %	-0.4896 ± 0.0201	4.1 %
02.729	LYRo36	-0.5656 ± 0.0173	3.0 %	-0.4366 ± 0.0352	8.1 %
31.795	LYRo87	-0.3813 ± 0.0452	12.0 %	-0.2822 ± 0.0635	22.5 %
27.857	LYRo80	-0.4017 ± 0.0362	9.0 %	-0.2859 ± 0.0628	21.9 %
10.984	LYRo67	-1.1101 ± 0.0391	3.5 %	-0.8481 ± 0.0313	3.7 %
10.995	LYRo71	-1.1180 ± 0.0907	8.1 %	-0.7922 ± 0.1218	15.4 %

Tabelle 8a

Differenz der Äquivalentbreiten
(Äquiv. korr. - Äquiv. + A)

Epoche	Kennz.	Differenz
31.021	LYRo83	-0.1135
03.108	LYRo39	-0.2486
03.118	LYRo43	-0.2460
07.204	LYRo47	-0.1230
07.213	LYRo50	-0.1041
27.311	LYRo77	-0.0594
02.335	LYRo27	-0.0898
02.343	LYRo30	-0.0824
08.366	LYRo56	-0.1300
08.443	LYRo61	-0.1223
08.516	LYRo64	-0.0255
02.723	LYRo33	-0.0702
02.729	LYRo36	-0.1290
31.795	LYRo87	-0.0991
27.857	LYRo80	-0.1158
10.984	LYRo67	-0.2620
10.995	LYRo71	-0.3258

(Vergleiche die Abbildung 20 auf Seite 38 zu Tabelle 8 und die
Abbildung 23 auf Seite 52 zu Tabelle 8a.)

Abb. 20
(He I - Äquivalentbreiten)

Abb. 21
 (Gesamtdarstellung der Variationen von
 H α , H β und He I in einem Diagramm)

3.3.3 Verhalten der Gesamtspektren und der Temperaturen

Von den 34 Spektren von Beta Lyrae (pro Kanal) wurden nur die 24 Spektren verwendet, für die eine gleichzeitig erfolgte Messung des Spektrums von Gamma Lyrae vorlag. Die Einflüsse der von Nacht zu Nacht stark wechselnden atmosphärischen Extinktion verfälschen einen Vergleich zwischen Gamma und Beta Lyrae Spektren die nicht in der gleichen Nacht aufgenommen wurden so stark, dass die Resultate zu ungenau sind.

Abgesehen von den atmosphärischen und instrumentellen Einflüssen auf das Aussehen des Spektrums, war während des Beobachtungszeitraumes bei Alpha und Gamma Lyrae keine Veränderung im Spektrum zu erkennen. Die vor allem bei den letzten Messungen (LYR 075/081/084/085) auftretende Abschwächung im kurzwelligen Spektralbereich des Spektrums von Gamma Lyrae, hat ihre Ursache wahrscheinlich in einer nicht genauen Lage des Sternbildes im Zentrum der Messblende. Da das Fernrohr auf den visuellen Farbbereich korrigiert ist, ist das Bild des Sterns im blauen Spektralbereich wesentlich grösser und es wirkt sich so eine Lage ausserhalb der Blendenmitte als Abschwächung im blauen Spektralbereich aus. Bei LYR075 ist dies sicher der Fall, da schon während der Messung festgestellt wurde, dass der Stern nicht im Zentrum der Blende war (vgl. Anmerkung t Seite 11). Da das Aussehen der Spektren bei den übrigen Messungen (LYR081/084/085) fast gleich ist und sonst keine andere Erklärung denkbar ist, scheint auch hier eine Dejustierung des Fadenkreuzes im Einstellokular vorgelegen zu haben. Unerklärlich ist jedoch, dass die Einstellung von Beta Lyrae stets besser gelang; die Spektren von Beta Lyrae weisen jedenfalls in dieser Beziehung keine grosse Abweichung von den anderen Spektren auf.

Bei Beta Lyrae waren im Verlauf der Periode charakteristische Änderungen im Aussehen des Spektrums feststellbar. Der Verlauf des Kontinuums ist in den verschiedenen Phasen deutlich unterschiedlich. Die Sichtbarkeit der Emissionslinien und deren Stärke im Vergleich zum Kontinuum zeigen ebenfalls eine deutliche Phasenabhängigkeit. (Zum Folgenden vergleiche die Abbildungen der Spektren auf den Auswerteformularen im Anhang.)

Beginnend bei der Phase 0.0, nimmt die Intensität des Kontinuums des Spektrums im blauen (kurzwelligen) Bereich stärker zu als im roten (langwelligen) Spektralbereich, bis bei etwa 0.5 der Periode wieder eine langsame Abschwächung des blauen Anteils des Kontinuums eintritt.

Betrachtet man bei den Messungen das Verhältnis der Gesamtstrahlung, die auf den Spektren als "MEAN" angegeben ist, zwischen Gamma und Beta Lyrae, so kann man, da der Einfluss der Spektrallinien auf diesen Wert in allen Phasen nur etwa 3% ausmacht, eine grobe Lichtkurve ableiten (vgl. Abb. 22 Seite 41). Die so erhaltene Lichtkurve von Beta Lyrae gleicht in ihrem wesentlichen Verlauf den in der Literatur angegebenen Lichtkurven (z.B. [19]). Der deutlichste Unterschied zeigt sich in einer Unsymmetrie der Höhe der beiden Maxima, von denen das bei den Phasen 0.7 - 0.8 grösser ist als das bei 0.2 - 0.3.

Abb. 22

("Lichtkurve" Beta Lyrae aus dem Verhältnis
der Gesamtintensitäten der Spektren von
Beta und Gamma Lyrae)

Zur Untersuchung der Temperatur von Beta Lyrae in den verschiedenen Phasen, wurde zuerst das Verhalten in verschiedenen Bereichskombinationen festgestellt (vgl. Abb. 15, 16 Seite 31). Bei Bereichskombinationen im (blauen) Spektralbereich um 500 nm (B1/B4, B1/B5) ist zwischen den Phasen 0.5 und 0.6 ein deutliches Maximum zu erkennen. Bei Phase 0.1 ist ein Nebenmaximum vorhanden. Die Minima befinden sich bei den Phasen 0.0 und 0.4. Bei Bereichskombinationen die schon etwas mehr in den (roten) Spektralbereich um 600 nm fallen (B2/B5, B2/B6), ist der Verlauf der Temperaturkurve bereits stark verändert. Maxima bei 0.1 - 0.2 und 0.9 - 0.0 und Minima bei 0.3 - 0.4 und ein langsamer Anstieg während der Phasen 0.4 - 0.9. Bei den Bereichskombinationen im roten Spektralbereich ist der Verlauf nicht eindeutig zu kennzeichnen. Insgesamt ist bei den Kombinationen B5/B7, B6/B7 ein Minimum bei Phase 0.5 zu sehen, während die Bereichskombinationen R1/R3 und R2/R3 das Minimum bei 0.38 zeigen und dann wie B2/B5, B2/B6 einen Anstieg von 0.4 bis 0.7 der Periode erkennen lassen. Allen Temperaturen ist zwischen den Phasen 0.3 und 0.4 ein Bereich stark streuender Messwerte gemeinsam. Der Verlauf der mittleren Farbtemperatur für die beiden Spektralbereiche (Abb. 17 Seite 32) gibt die oben beschriebenen Ein-

zelheiten ebenfalls wieder und es ist zwischen den beiden Temperaturkurven ein Unterschied feststellbar.

Die Fehler der mittleren Farbtemperaturen für Beta Lyrae (Tab. 5 und Abb. 17 Seite 32) sind sehr gross, obwohl die in den einzelnen Bereichkombinationen berechneten Temperaturen wesentlich genauer sind (etwa ± 5000 K). Dieses hat seine Ursache in der Mittelung über sehr verschiedene Bereiche, wobei auch die ungünstigsten Bereichkombinationen berücksichtigt werden mussten. Die berechneten Temperaturen von Gamma Lyrae (mittlere Farbtemperatur) haben einen Fehler von ± 4000 K ($\approx 20\%$) und die aus den Literaturwerten bestimmten Farbtemperaturen von Alpha Lyrae sind mit einem Fehler von ± 200 K sehr genau.

3.3.4 Spektrales Verhalten in den Linienscans

$H\alpha$: Bei 18 von insgesamt 30 Scans der Linie $H\alpha$ ($\lambda = 656.3$ nm) war der Scanbereich so gewählt, dass die He I - Emissionslinie bei $\lambda = 667.8$ nm (668.5 nm) mitregistriert wurde. Im allgemeinen kann aus dem Erscheinungsbild der Linie relativ zu $H\alpha$ gefolgert werden, dass sie sich in etwa analog verhält. Ausser diesen beiden Linien war der gesamte Scanbereich frei von erkennbaren Linien.

Die Änderungen in der Äquivalentbreite von $H\alpha$ sind in Tabelle 6 Seite 33 und in der Abbildung 18 Seite 34 dargestellt. Neben einem Hauptmaximum bei der Phase 0.0, ist ein Nebenmaximum bei der Phase 0.55 zu erkennen. Während die durchschnittlichen Werte von $W_\lambda(H\alpha)$ bei -1.70 nm liegen, hat das Hauptmaximum $W_\lambda(H\alpha) = -3.72$ nm und das Nebenmaximum $W_\lambda(H\alpha) = -2.0$ nm Äquivalentbreite. Der Verlauf der Äquivalentbreite zwischen den Hauptmaxima ist unsymmetrisch. Das Hauptmaximum ist mit einer Breite von 0.2 Perioden relativ schmal.

Eine Gesamtdarstellung der Variationen des Spektralbereiches um $H\alpha$ ist auf den Seiten 43 bis 46 gegeben.

Zur Lage der Linien ist zu sagen, dass der Scannullpunkt nicht fest ist. Eine Verschiebung des Sternbildes in der Eintrittsöffnung des Spektrumscanners hat eine Verschiebung des Scananfanges im Spektrum zur Folge. Es kann deshalb aus einer Verschiebung des Zentrums einer Linie nicht gefolgert werden, dass diese Linie tatsächlich im Gesamtspektrum verschoben erscheint. Deshalb wurden zur Markierung von Linien stets nur der relative Abstand zur Hauptlinie (hier z.B. $H\alpha$) angegeben, der konstant über eine Sequenz eingezeichnet wurde.

Aus dem Wandern der He I - Linie $\lambda = 667.8$ nm um die in einem Abstand von 12.2 nm von der $H\alpha$ - Linie eingezeichnete "Referenzlinie" ($\lambda = 668.5$ nm), ist zwar eine Radialgeschwindigkeit ableitbar, aber die Ursache der Verschiebung ist nicht eindeutig. Es können $H\alpha$, He I oder beide Linien zusammen verschoben sein.

(Auf den folgenden Seiten 43 bis 46 sind alle erhaltenen $H\alpha$ - Scans der Phase nach geordnet abgebildet. Zu beachten ist, dass der Intensitätsmasstab nicht bei allen Zeichnungen gleich ist!)

H β : Gleichzeitig mit H α wurde im zweiten Kanal des Spektrums-scanners die Emissionslinie H β ($\lambda = 486.1$ nm) registriert. H β liegt in einem Teil des Spektrums, der von sehr starken Veränderungen während der gesamten Periode gekennzeichnet ist. Nicht nur in der Umgebung der eingezeichneten Referenzlinie bei H $\beta + 5.6$ nm wechseln während einer Periode Emissions- und Absorptionslinien, sondern auch zum Beispiel am langwelligeren Ende des Scanbereiches. Um die Lage des Kontinuums für die Äquivalentbreitenbestimmung festlegen zu können, wurde die Statistik Abbildung 14 Seite 25 erstellt. Wie man sieht, wechselt eine zwischen den Phasen 0.0 bis 0.5 vorhandene Absorption an der kurzwelligen Seite von H β bei der Phase 0.6 auf die langwellige Seite (± 1.5 nm). Nach [27] handelt es sich dabei um eine Cr II - Linie. Bei der Referenzlinie von H $\beta + 5.6$ nm wandert eine Emissionslinie während der Phasen 0.1 bis 0.5 von H $\beta + 7.0$ nm nach H $\beta + 5.0$ nm, um dann verborgen zu bleiben. Statt dessen tritt nach der Phase 0.7 eine Absorption bei H $\beta + 6.5$ nm auf, die bis zur Phase 0.25 auf H $\beta + 5.5$ nm heranrückt. Nach [3] handelt es sich um eine weitere He I - Linie. Die weiter aussen gelegenen Emissions- und Absorptionslinien bei H $\beta + 16$ nm sind nicht in dieser Weise eindeutig zu beschreiben. Zum Vergleich dazu die H β - Sequenz auf den Seiten 48 bis 51. Die Äquivalentbreite von H β zeigt wie die oben beschriebene Linie H α , ebenfalls eine starke Variabilität mit der gleichen Phasenabhängigkeit (Tabelle 7 Seite 35 und Abbildung 19 Seite 36). Das Hauptmaximum liegt bei Phase 0.0, das Nebenmaximum bei Phase 0.6. Auch hier ist das Hauptmaximum schmal mit einer Breite von 0.1 der Periode. Der Maximalwert der Äquivalentbreite ist -0.64 nm bei einem Durchschnitt von -0.13 nm. Das Nebenmaximum beträgt -0.17 nm. Dass die Messungen von Chr. Spannagl stets zu grosse Äquivalentbreiten ergeben, liegt daran, dass durch eine ungünstige Lage der Linie H β im Scanbereich das Kontinuum nur falsch (zu klein) berechenbar ist.

(Auf den folgenden Seiten 48 bis 51 sind alle erhaltenen H β - Scans der Phase nach geordnet abgebildet. Zu beachten ist, dass der Intensitätsmasstab nicht bei allen Zeichnungen gleich ist!)

Hβ Hβ + 5.6 NM

Hβ Hβ + 5.6 NM

H β H β + 5.6 NM

H β H β + 5.6 NM

He I: Die He I - Emissionslinie bei $\lambda = 587.5$ nm liegt in einem steilen Bereich des Kontinuums. Auf ihrer langwelligen Seite wird die Emission durch die starke Absorption der beiden interstellaren Na I - D Linien bei $\lambda\lambda = 589.0 / 589.6$ nm verformt. Wegen der geringen spektralen Auflösung des Spektrumscanners können die Linien nicht getrennt werden (vgl. Abbildung 11 Seite 23).

Zur Bestimmung der Äquivalentbreite der He I - Linie wurde der Schnittpunkt des in die Linie hineininterpolierten Kontinuums mit der langwelligen Seite der Linie bestimmt und als Liniengrenze definiert. Der dabei auftretende Fehler in der Festlegung der Liniengrenze war unvermeidlich. Zusätzlich wurde auch noch die Äquivalentbreite einschliesslich der Absorption berechnet. Wie schon aus Abbildung 20 Seite 38 hervorgeht, in der die Äquivalentbreiten mit und ohne Absorption eingetragen sind, ist die Differenz zwischen den Äquivalentbreiten nicht konstant. Dies ist in Tabelle 8a Seite 37 und in Abbildung 23 nochmals verdeutlicht.

Abb. 23

(Differenz der Äquivalentbreiten He I - (He I + A))

Als Erklärung sind vier Möglichkeiten denkbar: die Intensität der He I - Linie schwankt; die Intensität der Na I - D Linien ist variabel; die Lage der He I - Linie ist nicht konstant; die Lage der Na I - D Linien ist nicht fest; oder eine Kombination diese Möglichkeiten. Da es sich bei den Na I - D Linien um interstellare Linien handelt, kann angenommen werden, dass diese Linien in Lage und Intensität konstant sind. Die Änderung beruht also auf einer Verschiebung der He I - Linie, was durch die veröffentlichten Radialgeschwindigkeitsmessungen an Beta Lyrae bestätigt wird [3]. Zum Vergleich die auf den Sei-

ten 54 bis 56 abgebildete Sequenz der He I - Linie.
Wie Tabelle 8 auf Seite 37 und Abbildung 20 Seite 38 zeigen, ist der Verlauf der Äquivalentbreiten über die Phase mit dem Verlauf von H α und H β vergleichbar. Der Abfall vom Hauptmaximum ($W_\lambda = -1.11\text{nm}$) scheint rascher zu erfolgen, das Nebenmaximum ($W_\lambda = -0.71\text{nm}$) liegt zwischen den Phasen 0.5 und 0.6 und der Kurvenverlauf zwischen den Hauptmaxima ist unsymmetrisch.

Der simultan zu He I aufgenommene Bereich um die Wellenlänge 417.5 nm zeigte keine Linien und kaum Veränderungen. Die Abbildung 24 zeigt zwei Beispiele für verschiedene Phasen. Da dieser Bereich in einem Gebiet liegt, das schon durch den raschen Abfall der Empfängerempfindlichkeit verfälscht ist, ist obige Feststellung (keine Linien) nur für die vorliegenden Spektren gültig!

Eine Gesamtdarstellung der Variationen der Äquivalentbreiten von H α , H β und He I gibt Abbildung 18 Seite 41.

Abb. 24
(Scanbereich um 417.5 nm für zwei Phasen)

(Auf den folgenden Seiten 54 bis 56 sind alle erhaltenen He I - Scans der Phase nach geordnet abgebildet. Zu beachten ist, dass der Intensitätsmasstab nicht bei allen Zeichnungen gleich ist!)

HeI HeI + 1.6 NM

HeI HeI + 1.6 NM

He I He I + 1.6 NM

He I He I + 1.6 NM

Um die von vielen Autoren gestellte Frage, ob die Variationen der Äquivalentbreiten nur durch die Schwankungen der Intensität des Kontinuums im Spektrum während der Periode vorgetäuscht werden zu beantworten, wurden aus der Lichtkurve (Abb. 22 Seite 41) und den gemessenen Äquivalentbreiten (Abb. 21 Seite 39) "absolute" Äquivalentbreiten für $H\alpha$, $H\beta$ und He I abgeleitet (Abb. 21a). Diese sind wegen der Ungenauigkeit der Lichtkurve nicht wirklich absolut, aber man kann auch so eine deutliche Phasenabhängigkeit feststellen, aus der zu schliessen ist, dass die Variationen in den gemessenen Äquivalentbreiten wirklich vorhanden sind.

Abb. 21a
("Absolute" Äquivalentbreiten $H\alpha$, $H\beta$, He I)

3.3.5 Kurzzeitvariationen

Da mit einem Scanner die zu messende Linie in kurzer Zeit (8 Sekunden) registriert wird, ist es möglich, durch Zusammenfassen der Äquivalentbreiten von nur wenigen Scans zu einem Messpunkt, das Verhalten einer Linie in sehr kurzen Zeiträumen zu untersuchen.

Um die von verschiedenen Autoren (vgl. dazu [15]) berichteten, in kurzer Zeit (Minuten) erfolgenden Änderungen zu erfassen, wurden die bei einer Messung von $H\alpha$, $H\beta$ oder He I innerhalb von 15 Minuten erhaltenen Äquivalentbreiten in drei Gruppen zusammengefasst und über diese Zeit gemittelt. Bei besonders interessanten Phasen, wie sie z.B. in [15] angegeben sind, wurden zusätzlich die während 15 Minuten erhaltenen Äquivalentbreiten in bis zu 50 Gruppen unterteilt. Dabei stellte sich heraus, dass es in keinem Fall sinnvoll war, die Gruppenszahl auf mehr als drei zu erhöhen, da das Verhältnis der Fehler der Einzelmessung zu der Streuung der Messpunkte immer ungünstiger wurde.

Für Nächte, in denen nur je eine Messung vorlag, konnte wegen der geringen Anzahl der Messpunkte (3) keine Aussage über eine Kurzzeitvariation getroffen werden.

Von den 10 Doppelbeobachtungen einer Linie in einer Nacht ($H\alpha$, $H\beta$ und He I), zeigte sich in drei Fällen ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Messungen (Tabelle 9).

Tabelle 9

Kurzzeitvariation $H\alpha$, $H\beta$ bei Beta Lyrae

Kennzeichen	Epochen	Δt	$\Delta H\alpha$	$\Delta H\beta$
LYRo38 / LYRo42	03.106 / 03.117	205	- 5 %	- 5 %
LYRo46 / LYRo49	07.202 / 07.209	125	+13 %	-
LYRo12 / LYRo14	01.258 / 01.262	70	- 4 %	-

Δt : Zeitunterschied der Messungen in Minuten

$\Delta H\alpha$, $\Delta H\beta$: Unterschied in den Äquivalentbreiten

Bei He I waren keine Unterschiede zwischen aufeinanderfolgenden Messungen in einer Nacht erkennbar, die grösser als der Fehler der Einzelmessung waren.

Zusammenfassend lässt sich feststellen:

Die von A. Sanyal in [15] festgestellten Variationen der Äquivalentbreiten von $H\alpha$ konnten, da diese Messungen bei anderen Phasen als die hier vorliegenden erfolgten, nicht bestätigt werden. Die in Tabelle 9 aufgeführten Änderungen sind aber gesichert.

Kann man die Abnahme der Äquivalentbreiten bei den Phasen .106/.117 und .258/.262 noch mit dem "normalen" Rückgang der Äquivalentbreiten erklären, so ist der Anstieg bei der Phase .202/.209 dadurch nicht erklärbar.

Dies lässt den Schluss zu, dass auch die von A. Sanyal gemessenen Variationen vorhanden sind.

3.3.6 H α , H β Äquivalentbreiten - Variation über verschiedene Perioden

Im Februar und März 1975 wurden von Chr. Spannagl mit der selben Instrumentierung vier Äquivalentbreitenbestimmungen von H α und H β vorgenommen. (Um Differenzen bei den Auswertemethoden auszuschliessen, wurden die auf Lochstreifen vorhandenen Messresultate nochmals mit den für die übrigen Messungen verwendeten Methoden ausgewertet.)

Schliesst man diese Beobachtungen mit in die Betrachtung ein, so erfolgten insgesamt 34 Beta Lyrae Äquivalentbreitenbestimmungen von H α und H β , mit einem maximalen Periodenunterschied von 68 Perioden (~ 2.3 Jahre). Dabei wurden vier Messungen bei nahezu gleicher Phase, aber in verschiedenen Perioden durchgeführt. Tabelle 10 gibt einen Vergleich der Messresultate.

Tabelle 10

Veränderungen der Äquivalentbreiten von H α und H β
zwischen verschiedenen Perioden bei Beta Lyrae

Kennz.	Julianisches Datum	Epoche	W_{λ} (H α) [nm]	W_{λ} (H β) [nm]
a) LYR002	2442939.503	00.252	-1.4565 $\pm$ 0.0151	-
LYR012	2442952.514	01.258	-1.4565 $\pm$ 0.0179	-0.0999 $\pm$ 0.0037
b) LYR004	2442944.510	00.643	-1.8213 $\pm$ 0.0233	-
LYR016	2442957.521	01.645	-1.6321 $\pm$ 0.0393	-0.1634 $\pm$ 0.0143
c) LYR006	2442947.458	00.867	-1.6675 $\pm$ 0.0377	-0.1350 $\pm$ 0.0215
LYR020	2442960.403	01.868	-1.5363 $\pm$ 0.0242	-0.0881 $\pm$ 0.0077
LYR007	2442947.487	00.869	-1.7087 $\pm$ 0.0089	-0.1468 $\pm$ 0.0098
d) LYR070	2443078.424	10.994	-3.5259 $\pm$ 0.1859	-0.6377 $\pm$ 0.0422
SPA001	2442470.654	-37.999	-3.4375 $\pm$ 0.1485	-0.5310 $\pm$ 0.0562

Im Fall a), bei dem leider zum Vergleich nur H α - Messungen vorliegen, ist zwischen den Perioden 0 und 1 keine Veränderung in den Äquivalentbreiten feststellbar.

Im Fall b) (ebenfalls nur H α) ist die während der Periode 1 gemessene Äquivalentbreite um etwa 10% geringer als bei Periode 0. Die Fehlergrenzen der Messungen sind jeweils nur 1.3% bzw. 2.4%!

Im Fall c), bei dem eine Messung der Periode 1 von zwei Messungen der Periode 0 eingeschlossen ist, ist ebenfalls ein Absinken der Äquivalentbreite bei der Periode 1 um 9% bei H α und um 40% bei H β feststellbar. Auch hier liegt dies weit über den Fehlergrenzen der einzelnen Messwerte (H α : 2.3%/1.6%/0.5%; H β : 15.9%/8.7%/6.7%).

Im Fall d), bei dem die grösste Differenz von 47 Perioden vorliegt, ist die Abweichung der für H α und H β gemessenen Werte noch gut innerhalb der Fehlerbereiche beider Messungen.

Ergebnis:

Von den vier untersuchten Fällen der Mehrfachbeobachtung der gleichen Phase in verschiedenen Perioden, sprechen zwei für und zwei gegen eine Variation der Äquivalentbreite zwischen den verschiedenen Perioden. Die Abweichungen in den Fällen b) und c) bei den Phasen .643/ .645 und .867/ .868/ .869 sind nicht

durch stark unterschiedliche Beobachtungsbedingungen zu erklären (vgl. Tabelle 1 Seite 9 ff.). Die Unveränderlichkeit der Äquivalentbreite bei den Fällen a) und d) tritt sowohl im Maximum der Lichtkurve, wie auch im Minimum auf, was gleichzeitig minimale und maximale Äquivalentbreite bedeutet.

Die Beobachtungsergebnisse legen nahe, dass eine Variation der Äquivalentbreite in den Fällen b) und c) sicherlich vorhanden, aber anscheinend an bestimmte Phasen gebunden ist.

Auch in der Literatur werden wiederholt Veränderungen zwischen verschiedenen Perioden beschrieben. O. Struve [20,21] berichtet über verschiedene Radialgeschwindigkeiten bei aufeinanderfolgenden Perioden, wobei anscheinend auch eine Phasenabhängigkeit auftritt. D. Wood und M. Walker [24] stellen eine Veränderung der Breite des Hauptminimums der Lichtkurve bei aufeinanderfolgenden Perioden fest. Schon 1933 unterscheidet A.C. Maury [12] bei einer Untersuchung der $H\alpha$ - Emission zwischen "starken", "normalen" und "schwachen" Perioden. A.H. Batten und J. Sahade [3] schliesslich berichten über Schwankungen der "Stärke" der $H\alpha$ - Emission in den verschiedenen Perioden. In vielen weiteren Arbeiten werden Änderungen zwischen verschiedenen Perioden angedeutet oder vermutet.

Abschliessend lässt sich sagen, dass ergänzt durch die Literatur der Schluss gezogen werden kann, dass (abhängig von der Phase) zwischen verschiedenen Perioden Änderungen auch in den Äquivalentbreiten von $H\alpha$ und $H\beta$ auftreten.

4. MODELLE DES SYSTEMS BETA LYRAE

In diesem Abschnitt werden die neueren in der Literatur zu findenden Modelle des Systems Beta Lyrae im Hinblick auf die in dieser Arbeit behandelten Beobachtungen beschrieben.

Modell I :

PASP (= Publications of the Astronomical Society of the Pacific)
 70, 5-40, 1958 O. Struve
 "The Problem of Beta Lyrae"

Das System Beta Lyrae besteht aus zwei Sternen (Spektraltyp B8 und F), die sich in sehr geringem Abstand umkreisen und dabei gegenseitig bedecken. Die Summe der Radien ist 0.97 des Abstandes der Sternzentren. Das Radiusverhältnis R_1/R_2 beträgt 1.7. Der B8-Stern ist vermutlich der grössere mit einem Radius zwischen $23 R_\odot$ und $94 R_\odot$. Aus dem Helligkeitsverhältnis der Oberflächen von 1:5, ergibt sich ein Temperaturverhältnis von 8000 K zu 15000 K (F/B8). Wenn die Sterne die Roche-Grenze ausfüllen, haben sie im Lagrange-Punkt L_1 Kontakt, sodass Massenaustausch stattfindet. Der F-Stern ist der Stern mit der grösseren Masse ($20 M_\odot$), aber unnormal leuchtschwach (underluminous), dessen Spektrum keine starken sichtbaren Absorptionslinien enthält, sondern nur Emissionslinien. Seine Bahngeschwindigkeit beträgt 100 km/s. Der B8-Stern hat geringere Masse ($10 M_\odot$) und trägt hauptsächlich zu dem Absorptionsspektrum bei. Seine Bahngeschwindigkeit beträgt 187 km/s.

Möglicherweise füllt in dem System nur der B8-Stern seine Roche-Grenze aus. Dies könnte die Folge einer Entwicklung sein, die von einem Doppelstern der Population I ausging und dessen massenreichere Komponente (F) sich schneller entwickelt hat. Sie ist nun zu einem Leuchtkraftschwachen, heissen Stern unterhalb der Hauptreihe geworden. Die ursprünglich massenärmere Komponente (anfangs $22 M_\odot$) befindet sich jetzt im Riesenstadium (jetzt $50 M_\odot$). Die Masse der Hülle des B8-Sternes beträgt 4×10^{23} kg, die Expansionsgeschwindigkeit 100 km/s und die Dicke der Hülle 10^{11} m. Der Massenverlust pro Sekunde von 4×10^{17} kg ($M_{B8} = 10^{32}$ kg) bewirkt eine Verlängerung der Periode um $\Delta P = 19$ s/a. Die von dem B8-Stern überfliessende Materie bildet um den F-Stern und das System eine sich in der Bahnebene konzentrierende Scheibe.

An spektroskopischen Details kann man erkennen; durch einen Gasstrom durch L_2 ergibt sich eine Variabilität der H - Absorption bei $P = 0.5 - 0.6$ (Phase); durch das Überströmen von Materie durch L_1 sowohl von dem F-Stern als auch von dem B8-Stern ergeben sich in den Phasen 0.92 bis 0.98 rote und bei den Phasen 0.001 bis 0.06 blaue Satellitenlinien bei den Absorptionslinien. Der Ort des Überströmens des Gases, das die roten Satellitenlinien (rotverschobene Linien) verursacht, ist näher an der Verbindungslinie der Sternzentren, als der Ort des Überströmens der Materie, die die blauen Satellitenlinien erzeugt. Die Linien sind sowohl in der Stärke, als auch in ihrer Lage nicht konstant. Grosse Geschwindigkeit in den blauen Linien kurz nach dem Auftauchen, grosse Geschwindigkeit in den roten Linien kurz vor dem Verschwinden. Die Geschwindigkeiten betragen 140 - 200 km/s (rot) und 80 - 360 km/s (blau).

Das Verhalten der H und He I - Emissionslinien ist in Phase mit dem F-Stern. Der Entstehungsort der Emissionslinien liegt

näher am F-Stern.

Die folgende Abbildung 25 gibt die Abbildung 9 der oben zitierten Arbeit von O. Struve modifiziert wieder.

Abb. 25
(Modell I)

Modell II :

APJ (= The Astrophysical Journal)

138, 342-349, 1963 Su-Shu Huang

"An Interpretation of Beta Lyrae (I)"

208, 780-788, 1976 Su-Shu Huang; D.A. Brown

"An Interpretation of Beta Lyrae II.

Disk Luminosity, Mass Ratio, and Nature of the Secondary Component."

Das System Beta Lyrae besteht aus einem Hauptstern (B8), der gerade seine Äquipotentialfläche ausfüllt und einem Begleiter der massenreicher (~ 5 mal), aber kleiner als der Hauptstern ist. Der Begleiter ist von einer am Rand mit 200 - 300 km/s rotierenden Scheibe aus Gas umgeben, die dicht und undurchsichtig ist und einen beträchtlichen Teil der Strahlung des Begleiters verschluckt. Die Neigung der Bahnebene und damit auch der Scheibe, beträgt nicht genau 90 Grad, sodass die auf den Himmelshintergrund projizierte Scheibe eine merkliche Fläche darstellt, die im Hauptminimum den Hauptstern zum Teil verdeckt. Da der Radius des Begleiters, wie er aus der Lichtkurve abgeleitet wird, zum grossen Teil von der Scheibe eingenommen wird, ist das Berühren der Sterne nur vorgetäuscht. Die Grösse des Begleiters ist 0.1 des Abstandes der Sternzentren. Die Grösse des Hauptsternes ergibt sich aus der Grösse der Roche-Grenze. Die Helligkeit der Scheibe trägt zur Gesamthelligkeit des Systems 30 - 40 % bei. Trotzdem konnte noch kein Spektrum der

Scheibe erhalten werden. Dies hat seine Ursache in der im Verhältnis zu dem Spektrum des Hauptsternes relativ schwachen Sichtbarkeit der Linien der Scheibe (nur etwa 3 % Beitrag der Scheiben-Absorptionslinien in den Linien des Hauptsternes, was nicht messbar ist). Die Exzentrizität der Bahnen im System ist Null. Der Spektraltyp des Begleiters muss aus Energiebilanzgründen B oder O sein. Die Scheibe ist im LTE und hat eine Temperatur ähnlich der des Hauptsternes. Die von dem Hauptstern auf die Scheibe fallende Strahlung trägt zur Aufhellung des sekundären Minimums bei.

Von dem Hauptstern geht ein Gasstrom zu der Scheibe um den Begleiter. Die rotierende Scheibe kann wahrscheinlich die über einen Zeitraum von einigen Jahren beobachteten Veränderungen in der Tiefe der Minima der Lichtkurve verursachen. Kleine Veränderungen können sich am Rand der Scheibe von Periode zu Periode ereignen. Die blau-verschobenen Linien unmittelbar nach dem Hauptminimum werden durch den Materiestrom von dem Hauptstern verursacht. Durch die Neigung der Bahnebene gegen die Sichtlinie ist dies sichtbar. Die rot-verschobenen Linien unmittelbar vor dem Hauptminimum können nicht durch einen Materiefluss vom Begleiter zum Hauptstern verursacht werden, da dieser seine Roche-Grenze nicht ausfüllt. Dieses System von Absorptionslinien ist mit der rotierenden Scheibe verknüpft, wobei es entweder durch die Scheibe selbst, oder durch einen entweichenden Gasstrom aus der Scheibe hervorgerufen wird. Betrachtet man die Beobachtungen zu Modell I, so kann man den Unterschied in der Streuung der Geschwindigkeiten der blau- und rot-verschobenen Linien leicht erklären. Das Überströmen von Gas ist mit einer grösseren Geschwindigkeitsstreuung behaftet, als die Rotation der Scheibe.

Die Gasdichte nimmt senkrecht zur Scheibe rasch ab, aber das Gas erstreckt sich noch in ein grosses Volumen, in dem die Emissionslinien erzeugt werden. Wenn die Gasatome sich von der Scheibe entfernen, haben sie noch einen niedrigen Anregungszustand, der durch die Temperatur der Scheibe bedingt ist. Weiter ausserhalb der Bahnebene werden sie dann von der Strahlung der beiden Sterne stärker angeregt und emittieren beim Rückfall auf die zweite Komponente die Emissionslinien. Dass der Begleiter sehr viel kleiner und massereicher ist als der Hauptstern, folgt auch aus der Existenz der Emissionen. Jede Emission kann ihre eigene lokale Entstehungsursache haben; z.B. kann die H α - Emission in dem äusseren Rand der Scheibe entstehen. Auch die das gesamte System einhüllende Korona ist eine Quelle der Emissionslinien.

Es wird ein Entwicklungsmodell für Beta Lyrae vorgeschlagen, in dem der Hauptstern zuerst der massenreichere Stern ist, der sich schneller entwickelt und nach Überschreiten der Roche-Grenze so viel Masse abgibt, bis der jetzige Zustand erreicht ist. Der Begleiter kann sowohl noch ein Hauptreihenstern, als auch schon ein kollabiertes Objekt sein.

Die Abbildung 26 Seite 63 gibt dieses Modell II in einer modifizierten Abbildung 1 der oben zitierten Arbeit von Huang wieder.

Abb. 26
(Modell II)

Modell III :

- Astronomy And Astrophysics Supplement Series
 Vol. 19, 57-89, 1975 U. Flora; M. Hack
 "Spectrographic Observations of Beta Lyrae
 During the International Campaign 1971"
 APJ 198, 453-465, 1975
 Hack, Hutchings, Kondo, McCluskey, Plavec, Poldian
 "The Ultraviolet Spectra of Beta Lyrae"
 Astronomy And Astrophysics 50, 335-342, 1976
 Hack, Heuvel, Hoekstra, de Jager, Sahade
 "An Investigation of the Ultraviolet Spectra of
 Beta Lyrae With the TD-1A Satellite"

Beta Lyrae besteht aus einem B9 II Hauptstern, der seine Roche-Grenze ausfüllt und aus einem kleinen Begleiter grosser Masse (Massenfunktion $5 M_{\odot}$; keine definitiven Massen angebar), der von einer flachen, zirkumstellaren Scheibe aus Gas umgeben ist. Die Scheibe um den unsichtbaren Begleiter, auf dessen Spektrum es keinen Hinweis gibt, ist so flach, dass das Spektrum des Hauptsternes auch bei der gegenseitigen Bedeckung stets sichtbar bleibt. Die beobachteten Daten lassen sich durch die Annahme erklären, dass der Begleiter ein "Schwarzes Loch" ist. Aber auch ein Hauptreihenstern, der durch die umgebende Hülle bzw. Scheibe stark verfälscht ist, kann die Beobachtungen an Beta Lyrae erklären. Das gesamte System wird von einer äusseren Hülle umgeben, in der die starken Emissionslinien entstehen. Diese Hülle expandiert mit einer Geschwindigkeit von ~ 170 km/s. Die beobachteten spektroskopischen Veränderungen mit der Phase lassen sich auf zwei Arten erklären:

- a) In der Hülle, die geschichtet ist, ist die Materie unsymmetrisch verteilt. Zwischen den beiden Sternen befindet sich eine Stelle hoher Dichte, die durch einen Massenfluss vom B9 II - Stern durch den Lagrange-Punkt L_1 verursacht wird und zwischen den Phasen 0.92 und 0.19 sichtbar ist. Dieser Gasstrom durch L_1 teilt sich in einen Teil der sich in Ro-

tationsrichtung der Scheibe bewegt und in einen Teil, der sich gegen die Rotationsrichtung der Scheibe bewegt und besonders während der Phasen 0.8 bis 0.93 sichtbar ist. Weiter ist ein Gasstrom durch L_2 feststellbar, der bei den Phasen 0.5 bis 0.75 sichtbar wird. (Vgl. Abbildung 27a.)

- b) Es existiert ein Gasstrom vom B9 II - Stern zur Hülle des Begleiters durch L_1 . Die beobachteten Satellitenlinien (vgl. Modell I) entstehen durch das Durchscheinen des B9 II - Sternes durch die Scheibe des Begleiters, die mit 300 km/s am Rand rotiert und zum Zentrum hin dichter wird. (Vgl. Abbildung 27b.)

Abb. 27
(Modell III)

(Aus der oben zitierten Arbeit, etwas verändert)

Modell IV :

APJ 189, 319-329, 1974 R.E. Wilson

"The Secondary Component of Beta Lyrae"

Der Hauptstern des Systems Beta Lyrae ist ein B8.5 II - Stern der seine Roche-Grenze ausfüllt und gebunden rotiert. Die zweite Komponente besteht aus einem Hauptreihenstern, der den Massenfluss von der ersten Komponente in einer dicken Scheibe (Achsenverhältnis 1:3) aufammelt. Die Scheibe rotiert differentiell. Die Masse der Scheibe beträgt einige $M_{\odot}$, die des Begleiters etwa $13 M_{\odot}$. Die Leuchtkraft des Begleiters ist gleich oder grösser als die Leuchtkraft des Hauptsternes. Die Strahlung wird durch die dicke Scheibe in Richtung der Bahnebene stark geschwächt und die meiste Strahlung tritt an den Polregionen aus, die nur streifend gesehen werden. Diese Strahlung regt das B2-B5 Hüllenspektrum, das beobachtet wird, an. Die k Strahlungstemperatur an den Polen beträgt 11250 K . Es gibt keinen Grund einen kollabierten Stern im Zentrum der Scheibe anzunehmen.

nehmen. Das Massenverhältnis beträgt $M_2/M_1 = 4.2$. Die Geometrie des Systems wird durch die Lichtkurve bestätigt. Wegen der Nähe des Hauptsterns, muss die Scheibe symmetrisch zur Bahnebene sein. Das Spektrum der Scheibe ist zusammengesetzt, da die Temperatur über die Scheibe nicht gleich ist und deshalb nur schwer zu identifizieren.

Modell V :

APJ 141, 155-160, 1965 N.J. Woolf
"The Problem of Beta Lyrae"

Der Hauptstern von Beta Lyrae füllt mit seiner Photosphäre sein kritisches Potential aus, das etwas weniger ausgedehnt ist als die Roche-Grenze. Die Massen der Komponenten sind $20 M_\odot$ und $11.7 M_\odot$. Der Begleiter ist eine Scheibe mit einer zentralen Verdichtung. Die Leuchtkraftschwäche des Begleiters ist erklärbar durch die Scheibe, die etwa die Hälfte der Masse des Begleiters enthält. Die Scheibe stammt aus einem Massenfluss vom Hauptstern.

Modell VI :

APJ 204, 512-515, 1976 J. Ziolkowski
"An Evolutionary Model of Beta Lyrae"

Der heutige Zustand eines Doppelsternsystems wie Beta Lyrae wird durch die Entwicklung eines Doppelsternes mit den Anfangsdaten $M_1 = 10 M_\odot$, $M_2 = 3.7 M_\odot$, $P = 3^d.44$ erreicht. Nachdem der Hauptstern (1) seine Roche-Grenze nach dem Wasserstoffbrennen überschritten hat, entsteht im Laufe von etwa 63500 Jahren durch Massenaustausch ein System wie es in Modell II oder V beschrieben ist. (B8.5 II Hauptstern und ein von einer Scheibe eingehüllter Begleiter). Es sind keine exotischen Erklärungen wie "Schwarzes Loch" o.ä. notwendig.

Vergleicht man die hier kurz skizzierten sechs Modelle, so stellt man an entscheidenden Unterschieden fest:

Modell II nimmt im Gegensatz zu Modell I eine zirkumstellare Gasscheibe um den Begleiter an. Ist bei Mod. I noch die beide Sterne umgebende Gashülle die alleinige Quelle der Emissionen, so entstehen bei Mod. II auch Emissionen in der Scheibe.

Modell III gibt als Entstehungsort der Emissionslinien wieder eine das gesamte System einhüllende Gaswolke an, jedoch wird auch hier der nun sehr kleine und massereiche Begleiter von einer Scheibe umgeben. Ein kollabiertes Objekt im Zentrum der Scheibe wird nicht ausgeschlossen wie in Modell IV. In diesem Modell wird die Scheibe um den Begleiter genauer beschrieben, wobei als Ursache für die Emissionen die Strahlung des Begleiters, der ein B2 bis B5 - Stern ist, angenommen wird.

Die Modelle V und VI runden das Bild, das von den vorangegangenen Modellen aufgestellt wurde, durch genauere Massenangaben und ein Entwicklungsmodell ab.

5. INTERPRETATION DER MESSRESULTATE

Die zu Erläuterungen der Vorgänge abgebildeten Skizzen des Systems Beta Lyrae, sind vereinfacht nach Modell III gefertigt (vgl. Seite 63 ff.). In diesen Zeichnungen werden fortlaufend die zur Erklärung notwendigen Details eingetragen.

Temperatur:

Vergleicht man die mittlere Farbtemperaturen von Beta Lyrae (Seite 32) mit der Temperaturkurve in [22], so stellt man eine recht gute Übereinstimmung der blauen Temperaturkurve mit der veröffentlichten fest. Die von L. Terkán beobachteten Temperaturen scheinen gegen die in Abbildung 17 Seite 32 dargestellten nur etwas zu höheren Phasen verschoben zu sein. Berücksichtigt man, dass L. Terkán die Temperatur aus der Farbe des Sternes bestimmte, so muss man in Abbildung 17 beide Temperaturkurven zusammen betrachten, und in diesem Fall ergibt sich fast der identische Verlauf der Temperaturkurven während einer Periode.

Ein Unterschied besteht allerdings in der Grösse der gemessenen Temperaturen. Während L. Terkán als Mittelwert über eine Periode etwa 11000 K angibt, liegt der Mittelwert der hier vorliegenden Temperaturen bei etwa 23000 K. Dies liegt an der Tatsache, dass L. Terkán die Farbtemperaturen aus den unkorrigierten Farbindizes berechnete, während in dieser Arbeit sowohl die interstellare Absorption berücksichtigt wurde, als auch kleinere Bereiche im Spektrum zu Temperaturbestimmung herangezogen wurden, sodass die angegebenen Farbtemperaturen für die einzelnen Bereiche gelten und nicht aus dem gesamten sichtbaren Spektrum abgeleitet sind.

Durch die Aufteilung des beobachteten Spektrumausschnittes in mehrere Bereiche, in denen jeweils die Farbtemperatur bestimmt wurde, ergab sich andeutungsweise ein verschiedener Verlauf der Farbtemperaturkurve mit der Phase für den blauen und den roten Wellenlängenbereich (vgl. Abbildung 17 Seite 32). Die hauptsächlichsten Unterschiede liegen in einer höheren Temperatur im blauen Spektralbereich ($T_F(\text{blau}) \approx 25000 \text{ K}$, $T_F(\text{rot}) \approx 19000 \text{ K}$) und in einem besonders während der Phasen Null und .5 unterschiedlichen Verhalten.

Auch das auf Seite 40 beschriebene Verhalten der im Anhang abgebildeten Gesamtspektren mit einer Variation des Verhältnisses von rotem zu blauem Spektralbereich deutet auf eine Temperaturveränderung hin, wie sie oben beschrieben ist.

Für eine weitergehende Interpretation (z.B. Temperatur der Komponenten von Beta Lyrae), ist die Genauigkeit der Farbtemperaturbestimmung wie sie hier angewandt wurde nicht ausreichend genug.

Der Verlauf der Temperaturkurve mit Maxima bei 0.23 (Hauptmaximum) und 0.65 der Periode und mit Minima bei 0.0 und 0.38 der Periode, deuten auf eine Stelle hoher Temperatur zwischen den beiden Komponenten von Beta Lyrae hin. (Bild s. Seite 67 oben.)

Lichtkurve:

Aus den Intensitäten der Gesamtspektren wurde eine Lichtkurve (Abb. 22 Seite 41) errechnet, die den veröffentlichten Lichtkurven gleicht, wobei besonders zu beachten ist, dass auch hier wie in einigen der anderen Arbeiten das zweite Maximum bei Phase 0.75 etwas höher ist, als das erste bei Phase 0.25. Dies kann so interpretiert werden, dass ein Gasstrom vom Hauptstern zum Begleiter durch den Punkt L_1 , der ja besonders während der Phasen um 0.25 sichtbar ist, einen Teil des Lichtes der beiden Sterne abdeckt und so das erste Maximum abschwächt.

Äquivalentbreiten:

Da der Verlauf der Äquivalentbreiten (W_λ) der Emissionslinien $H\alpha$, $H\beta$ und $He I$ während allen Phasen gleich war (vgl. Abb. 21 Seite 39), liegt die Vermutung nahe, dass der Entstehungsort der Linien der gleiche ist. Ein paralleler Verlauf der Äquivalentbreiten könnte ausserdem durch die von einigen Autoren herausgestellte Vermutung hervorgerufen werden, dass die Variationen der W_λ nur durch den Wechsel in der Intensität des Kontinuums während einer Periode (=Lichtkurve) vorgetäuscht werden. Diese Vermutung konnte aber durch die Untersuchung der "absoluten" Äquivalentbreiten, d.h. der Äquivalentbreiten bezogen auf ein konstantes Kontinuum, entkräftet werden (vgl. Abb. 21a Seite 56). Lediglich bei dem Hauptmaximum der W_λ bei Phase 0.0 ist eine verstärkende Wirkung durch den Rückgang des Kontinuums deutlich zu sehen. Auch der im Gegensatz zur Lichtkurve stark unsymmetrische Verlauf der Äquivalentbreiten-Kurve, spricht gegen die obige Annahme.

Die Unsymmetrie im Verlauf der Äquivalentbreiten während der Periode, wird vor allem durch das unsymmetrisch bei Phase 0.6

liegende Nebenmaximum verdeutlicht, während das Hauptmaximum der Äquivalentbreiten genau bei Phase 0.0 liegt. Die beiden Minima, von denen das zweite etwas tiefer ist, liegen bei den Phasen 0.25 und 0.85, also ebenfalls unsymmetrisch. (Fast die gleichen Kurven sind in [12] für $H\beta$ wiedergegeben.)

Zur Erklärung soll folgender Modellvorschlag dienen: Nahe am Lagrange - Punkt L_1 befindet sich an der Scheibe um

den Begleiter ein Auftreffpunkt eines Teils des Gasstromes vom Hauptstern. Dort wird durch das Auftreffen des Gases ein "heisser Fleck" erzeugt, in dem teilweise die Emissionslinien entstehen. Bei Phase 0.25 wird der Fleck von dem Gasstrom, der sich weiter aussen bewegt, verdeckt. Bei Phase 0.6 wird der Fleck nach der Bedeckung durch den Hauptstern wieder sichtbar (Nebenmaximum).

Durch die weitere Drehung des Systems verschwindet allmählich der Fleck, bis er bei Phase 0.85 ganz von der Scheibe abgedeckt ist. Das starke Ansteigen der Äquivalentbreiten bei Phase 0.0 ist nur dadurch zu erklären, dass die Intensität des Kontinuums in diesem Fall so stark abnimmt, dass hier - wie auch die "absoluten" Äquivalentbreiten nahelegen - ein Ansteigen der W_λ in dem beobachteten Masse nur vorgetäuscht wird.

Kurzzeitvariationen in den Äquivalentbreiten:

Die von A. Sanyal [15] berichteten Veränderungen der Äquivalentbreiten im Minuten- und Stundenbereich, konnten wegen zu geringer Dichte des Beobachtungsmaterials nur in drei Fällen festgestellt werden. Alle drei Beobachtungen liegen zwischen den Phasen 0.1 bis 0.26 und Veränderungen sind nur bei $H\alpha$ (einmal $H\beta$) festzustellen. (Die Beobachtungen von A. Sanyal liegen bei anderen Phasen.)

Die kurzzeitigen Änderungen in den Äquivalentbreiten treten also dann auf, wenn der Gasstrom, der vom Hauptstern zum Begleiter fließt, am deutlichsten sichtbar ist und vor dem "heissen Fleck" vorbeizieht. Dies ist eine gute Bestätigung der bisherigen Vorstellungen. Auch eine Emission in dem Gasstrom selbst ist möglich, denn auch dabei kann es durch die Bewegung des Stromes zu Kurzzeitvariationen kommen.

Dass in den übrigen Phasen keine Variationen festgestellt werden konnten, ist durch das Beobachtungsmaterial bedingt.

Periodenvariabilität der Äquivalentbreiten:

Die von vielen Autoren (vgl. Seite 59) festgestellte Veränderlichkeit konnte in zwei Fällen bestätigt werden. Sowohl in $H\alpha$ als auch in $H\beta$ wurde zwischen zwei aufeinander folgenden Perioden (0 und 1) eine Abweichung der gemessenen Äquivalentbreiten bei den Phasen 0.64 und 0.87 festgestellt. Die Abweichungen liegen nicht mehr innerhalb der Fehlergrenzen. Bei den zwei weiteren untersuchten Messungen konnte keine Veränderung zwischen den Perioden festgestellt werden.

Dies ist besonders im Fall der Bedeckung bei Phase 0.99 interessant, da hier der maximale Periodenunterschied von 48 Perioden (~ 1.7 Jahre) vorliegt. Im anderen Fall bei Phase 0.25 liegt nur eine Periode zwischen den Beobachtungen.

Die Veränderungen von W_λ bei Phase 0.64 können auf eine Veränderung des Gasstromes durch L_2 hindeuten, der in Modell III (Seite 64 f.) und I (Seite 60 f.) beschrieben wird.

Die beobachtete Variation bei Phase 0.87 deutet auf eine Veränderung in der Scheibe um den Begleiter hin, da ja gerade in dieser Phase der "heisse Fleck" von der Scheibe verdeckt wird.

Die Konstanz der Messresultate im Fall der Phase 0.0 liegt vermutlich daran, dass durch das starke Absinken der Gesamtintensität des Kontinuums ein so grosser Anstieg der Äquivalentbreite vorgetäuscht wird, dass geringe Veränderungen in den absoluten W_λ nicht beobachtbar sind. Die Unveränderlichkeit bei Phase 0.25, einem Bereich mit ansonsten starken Störungen, kann zufällig sein.

6. ZUSAMMENFASSUNG

Durch eine Bestimmung der Farbtemperatur von Beta Lyrae in verschiedenen kleinen Bereichen des Spektrums, ergab sich ein Unterschied in der Variation der Farbtemperatur mit der Phase zwischen dem blauen und dem roten Spektralbereich. Ebenso war ein Unterschied zwischen den mittleren Farbtemperaturen der beiden Bereiche angedeutet ($T_F(\text{blau}) \approx 25000 \text{ K}$, $T_F(\text{rot}) \approx 19000 \text{ K}$).

Der Verlauf der Farbtemperaturen mit der Phase, die aus den Gesamtintensitäten der Spektren abgeleitete grobe Lichtkurve und das beobachtete Verhalten der Äquivalentbreiten der Linien $\text{H}\alpha$, $\text{H}\beta$ und He I mit der Phase, werden durch das folgende Modell von Beta Lyrae erklärt.

Der Hauptstern (1) füllt seine Roche-Grenze aus, und es fließt ein Gasstrom (2) durch den Lagrange-Punkt L_1 zum Begleiter (3), der von einer Scheibe (4) aus Gas umgeben ist. Ein Teil des Gasstromes trifft die Scheibe in der Nähe von L_1 und erzeugt dort einen "heissen Fleck" (5), in dem teilweise die Emissionlinien von $\text{H}\alpha$, $\text{H}\beta$ und He I entstehen. Der andere Teil des Gasstromes (6) fließt in Bewegungsrichtung des Systems um den Begleiter und verdeckt so bei Phase 0.25 teilweise den Entstehungsort der Emissionen, was zu kurzzeitigen Veränderungen in der Stärke der Äquivalentbreiten führt. Das sehr starke Ansteigen der Äquivalentbreiten bei Phase 0.0 ist nur ein Effekt, der durch das Absinken der Intensität des Kontinuums im Gesamtspektrum vorge-täuscht wird. Durch Ableiten von "absoluten" Äquivalentbreiten konnte aber auch nachgewiesen werden, dass eindeutig auch eine Variabilität der "absoluten" Äquivalentbreiten vorhanden ist. Die Periodenvariabilität deutet auf einen Gasstrom durch L_2 (7), der in Bewegungsrichtung zurückbleibt.

Dieses Modell entspricht etwa dem Modell III (Seite 63 f.), mit dem Unterschied, dass zusätzlich noch ein "heisser Fleck" angenommen wurde, der die Temperatur- und die Lichtkurve erklärt und teilweise auch für die Emissionen verantwortlich ist.

7. LITERATUR

Die in der Arbeit zitierten Literaturstellen sind hier alphabetisch geordnet aufgeführt. Ein zusätzliches Literaturverzeichnis mit Arbeiten über Beta Lyrae befindet sich im Anhang A2.

- 1 : Abt, A. et al.
"The Visual Multiple System Containing Beta Lyrae"
APJ, 135, 429-438, 1976
- 2 : Babst, U.
"Entwicklung und Erprobung einer photoelektrischen
Teleskopnachführung für Sternbeobachtungen."
Diplomarbeit, München 1975
- 3 : Batten, A. H.; Sahade, J.
"The Emission Profile of H α in the Spectrum of
Beta Lyrae"
PASP, 85, 599, 1973
- 4 : Flora, U.; Hack, M.
"Spectrographic Observations of Beta Lyrae During the
International Campaign of 1971"
Astr. & Astrophys., Suppl. Ser. Vol. 19, 57-89, 1975
- 5 : Kopal, Z.
"On the Nature of the System of Beta Lyrae"
APJ, 93, 92-103, 1941
- : Struve, O.
"The Spectrum of Beta Lyrae"
APJ, 93, 104-117, 1941
- : Gill, J. R.
"Some Line Intensities in Beta Lyrae"
APJ, 93, 118-127, 1941
- : Greenstein, J. L.; Page, T. L.
"The Spectrum of Beta Lyrae in the Visual Region"
APJ, 93, 128-132, 1941
- : Kuiper, G. P.
"On the Interpretation of Beta Lyrae and Other Close
Binaries"
APJ, 93, 133-177, 1941
- 6 : Hack, M. et al.
"The Ultraviolet Spectrum of Beta Lyrae"
APJ, 198, 453-465, 1975
- 7 : Hack, M. et al.
"An Investigation of the Ultraviolet Spectra of Beta
Lyrae With the TD-1A Satellite"
Astr. & Astrophys., 50, 335-342, 1976
- 8 : Huang, Su-Shu
"An Interpretation of Beta Lyrae" (I)
APJ, 138, 342-349, 1963
- 9 : Huang, Su-Shu; Brown, D. A.
"An Interpretation of Beta Lyrae II. Disc Luminosity,
Mass Ratio, and Nature of the Secondary Component"
APJ, 208, 780-788, 1976
- 10: Johnson, H. L.; Borgmann, J.
"The Law of Interstellar Extinction"
B.A.N., 17, No. 2, 115-126, 1963

- 11: Larsson-Leander, G.
"Photometric Results from the 1959 International Campaign on Beta Lyrae"
Arkiv för Astronomi, 5, 253-295, 1969
- 12: Maury, A. C.
"The Spectral Changes of Beta Lyrae"
Annals of Harvard College Observatory, 84, No. 8, 207, 1933
- 13: Oke, J. B.; Schild, R. E.
"The Absolute Spectral Energy Distribution of Alpha Lyrae"
APJ, 161, 1015-1023, 1970
- 14: Rocznik,
Astronomiczay Obserwatorium Krakowskiego 1976
International Supplement Nr. 47, 1975
- 15: Sanyal, A.
"High Time-Resolution Spectroscopy of Beta Lyrae at H α "
APJ, 210, 853-861, 1976
- 16: Scheffler, H.; Elsässer, H.
"Physik der Sterne und der Sonne"
Bibliographisches Institut AG, Zürich 1974
- 17: Schoembs, R.
"Photometrische Untersuchungen an sehr schnell variablen Objekten"
Dissertation, Universität München, 1971
- 18: Spannagl, Chr.
"Spektralphotometrische Extinktionsmessungen"
Diplomarbeit, München 1973
- 19: Struve, O.
"The Problem of Beta Lyrae"
PASP, 70, 5-40, 1958
- 20: Struve, O.
"The Rotational Disturbance of the Velocity Curve of Beta Lyrae"
PASP, 70, 585, 1958
- 21: Struve, O.
"Spectroscopic and Photometric Anomalies in Beta Lyrae"
PASP, 71, 441-444, 1959
- 22: Terkán, L.
"Über die periodischen Temperaturveränderungen von Beta Lyrae, deren Verlauf nahe das Spiegelbild der Lichtkurve ist."
Astr. Nachr. Bd. 226, Nr. 5422, 345-358, 1926
- 23: Wilson, R. E.
"The Secondary Component of Beta Lyrae"
APJ, 189, 319-329, 1974
- 24: Wood, D.; Walker, M. F.
"Photoelectric Observations of Beta Lyrae"
APJ, 131, 363, 1960
- 25: Woolf, N. J.
"The Problem of Beta Lyrae. 2. The masses and the Shapes"
APJ, 141, 155-160, 1965
- 26: Ziolkowski, J.
"An Evolutionary Model of Beta Lyrae"
APJ, 204, 512, 1976
- 27: Soviet Astr. Jour. Bd. 36, 1959
- 28: Catalogue of Bright Stars
Yale University Observatory 1964

ANHANG

A1 Auswerteformulare zur Temperaturbestimmung
mit den dazugehörigen Spektren

A1-1 bis A1-25

A2 Auswahl von Literatur über Beta Lyrae

Verzeichnis der abgebildeten Spektren

	Phase	Kennzeichen	Kennzeichen	Phase
A1- 1	31.018	LYRo81	LYR A / LYRo19	1.866
A1- 2	31.023	LYRo84	LYR A / LYRo21	1.876
A1- 3	3.104	LYRo37	LYR C / LYRo23	1.952
A1- 4	3.115	LYRo41	LYRo25	2.331
A1- 5	7.207	LYRo48	LYRo28	2.339
A1- 6	3.264	LYRo44	LYRo31	2.719
A1- 7	27.308	LYRo75	LYRo34	2.726
A1- 8	2.331	LYRo25	LYRo37	3.104
A1- 9	2.339	LYRo28	LYRo41	3.115
A1-10	8.357	LYRo51	LYRo44	3.264
A1-11	8.363	LYRo54	LYRo48	7.207
A1-12	8.370	LYRo57	LYRo51	8.357
A1-13	8.439	LYRo59	LYRo54	8.363
A1-14	8.513	LYRo62	LYRo57	8.370
A1-15	2.719	LYRo31	LYRo59	8.439
A1-16	2.726	LYRo34	LYRo62	8.513
A1-17	31.791	LYRo85	LYRo65	10.981
A1-18	1.866	LYR A / LYRo19	LYRo69	10.992
A1-19	1.876	LYR A / LYRo21	LYRo75	27.308
A1-20	1.952	LYR C / LYRo23	LYRo81	31.018
A1-21	10.981	LYRo65	LYRo84	31.023
A1-22	10.992	LYRo69	LYRo85	31.791

=====
A1-23 LYRo40 / LYRo41
A1-24 LYRo68
A1-25 LYRo72 / LYRo73
=====

=====
Bei den Abbildungen der Spektren ist zu beachten,
dass der Nullpunkt der Wellenlängenskala willkür-
lich ist, der Masstab jedoch richtig ist; der Mas-
stab der Intensitätsskala ist bei den Abbildungen
oft verschieden!
=====

Lage der Linien

H γ	H β	He I	H α	λ [nm]	H γ	H β	He I	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
368	502	...	448	Punkte	(364?)	496	762	942

Nullpunkte der Spektren

λ [nm]	λ [nm]	λ [nm]	λ [nm]
294.4	295.6	...	296.6
295.6			297.9
			298.4
			298.9
			298.4

Lage der Bereiche

313	328	343	B1: 420 nm	376	321	336
431	446	461	B2: 465 nm	424	439	454
550	565	580	B3: 510 nm	543	558	573
656	671	686	B4: 550 nm	648	663	678
800	815	830	B5: 605 nm	793	808	823
856	871	886	B6: 630 nm	859	874	889
943	958	973	B7: 670 nm	964	979	994

Mittelwerte der Bereiche

1.7022	B1	1.6171
2.19424	B2	2.7378
2.0752	B3	2.0563
1.2062	B4	1.2576
0.5392	B5	0.5793
0.3505	B6	0.3887
0.1538	B7	0.1822

Bereichkomb.	T(Lyr)	T(β Lyr)	Bereichkomb.	T(Lyr)	T(β Lyr)
B1/B2	 K	41550 K	B3/B4	 K	20570 K
B1/B3	 K	31250 K	B3/B5	 K	48000 K
B1/B4	 K	31170 K	B3/B6	 K	31450 K
B1/B5	 K	39488 K	B3/B7	 K	21170 K
B1/B6	 K	34612 K	B4/B5	 K	 K
B1/B7	 K	27700 K	B4/B6	 K	63500 K
B2/B3	 K	22030 K	B4/B7	 K	20650 K
B2/B4	 K	21590 K	B5/B6	 K	13250 K
B2/B5	 K	31100 K	B5/B7	 K	11000 K
B2/B6	 K	27690 K	B6/B7	 K	9660 K
B2/B7	 K	14018 K

Lage der Linien

H β	HeI	H α		H β	HeI	H α
486.1	587.5	656.3	λ [nm]	486.1	587.5	656.3
...	...	...	Punkte	...	313?	499?

Nullpunkte der Spektren

.....			λ [nm]		472.5	473.8
-------	-------	-------	----------------	-------	-------	-------

Mittelwerte der Nullpunkte

.....	λ [nm]	472.7
-------	----------------	-------

Lage der Bereiche

	R1: 545 nm	182	-	197	-	212
	R2: 610 nm	359	-	376	-	389
	R3: 680 nm	549	-	564	-	579

Mittelwerte der Bereiche

	R1	2.5387
	R2	1.2253
	R3	0.3595

Bereichkombination	T(Lyr)	T(Lyr)
R1/R2	 K	 K
R1/R3	 K	 K
R2/R3	 K	 K

Lage der Linien

H γ	H β	HeI	H α	λ [nm]	H γ	H β	HeI	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
373	508	...	953	Punkte	...	503	768	949

Nullpunkte der Spektren

292.9	293.4		294.7	λ [nm]		295.3	296.1	296.2
	293.7			Mittelwerte der Nullpunkte			295.9	
				λ [nm]				

Lage der Bereiche

318	333	348	B1: 420 nm	312	327	343
437	452	467	B2: 465 nm	431	446	461
555	570	585	B3: 510 nm	549	564	579
661	676	691	B4: 550 nm	655	670	685
776	791	806	B5: 605 nm	800	815	830
871	886	901	B6: 630 nm	866	881	896
977	992	1007	B7: 670 nm	971	986	1001

Mittelwerte der Bereiche

1.6272	B1	1.5295
2.9391	B2	2.17665
2.0930	B3	2.0776
1.2718	B4	1.3001
0.5486	B5	0.6163
0.3626	B6	0.4154
0.1685	B7	0.1884

Bereichkomb.	T(Lyr)	T(β Lyr)	Bereichkomb.	T(Lyr)	T(β Lyr)
B1/B2	 K	29870 K	B3/B4	 K	32210 K
B1/B3	 K	27950 K	B3/B5	 K	25940 K
B1/B4	 K	32930 K	B3/B6	 K	25140 K
B1/B5	 K	29570 K	B3/B7	 K	30130 K
B1/B6	 K	28780 K	B4/B5	 K	21990 K
B1/B7	 K	32880 K	B4/B6	 K	21880 K
B2/B3	 K	33990 K	B4/B7	 K	27670 K
B2/B4	 K	27190 K	B5/B6	 K	21820 K
B2/B5	 K	25380 K	B5/B7	 K	27680 K
B2/B6	 K	25830 K	B6/B7	 K	 K
B2/B7	 K	16190 K

Lage der Linien

H β	HeI	H α	λ [nm]	H β	HeI	H α
486.1	587.5	656.3	Punkte	486.1	587.5	656.3
.....		585			319	586

Nullpunkte der Spektren

.....		470.8	λ [nm]		470.3	470.4
-------	-------	-------	----------------	-------	-------	-------

Mittelwerte der Nullpunkte

470.8	λ [nm]	470.3
-------	----------------	-------

Lage der Bereiche

187	-	202	-	217	188	-	203	-	218
364	-	379	-	394	365	-	380	-	395
554	-	569	-	584	555	-	570	-	585
.....									

Mittelwerte der Bereiche

2.8667	R1	0.6613
1.2834	R2	1.2887
0.6879	R3	0.5467

Bereichkombination	T(Lyr)	T(β Lyr)
R1/R2	 K	70000 K
R1/R3	 K	16600 K
R2/R3	 K	12600 K

Lage der Linien

H γ	H β	HeI	H α	λ [nm]	H γ	H β	HeI	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
367	503	...	949	Punkte	(365)	496	758	942

Nullpunkte der Spektren

λ [nm]	λ [nm]	λ [nm]
374.8	295.3	...
...	395.4	...
296.2	...	...
...	397.9	299.9
...	...	298.9
...	...	298.9

Mittelwerte der Nullpunkte

λ [nm]	...	298.9
----------------	-----	-------

Lage der Bereiche

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
420 nm	465 nm	510 nm	550 nm	605 nm	630 nm	670 nm

Mittelwerte der Bereiche

B1	1.5236
B2	2.6865
B3	2.1118
B4	1.3069
B5	0.6271
B6	0.4182
B7	0.2197

Bereichkomb.	T(Lyr)	T(β Lyr)	Bereichkomb.	T(Lyr)	T(β Lyr)
B1/B2	...	19280 K	B3/B4	...	...
B1/B3	...	25680 K	B3/B5	...	104440 K
B1/B4	...	38710 K	B3/B6	...	48670 K
B1/B5	...	41340 K	B3/B7	...	27440 K
B1/B6	...	36850 K	B4/B5	...	54700 K
B1/B7	...	39970 K	B4/B6	...	28740 K
B2/B3	...	38580 K	B4/B7	...	6360 K
B2/B4	...	67400 K	B5/B6	...	13860 K
B2/B5	...	63750 K	B5/B7	...	12110 K
B2/B6	...	45720 K	B6/B7	...	...
B2/B7	...	16860 K

Lage der Linien

H β	HeI	H α	λ [nm]	H β	HeI	H α
486.1	587.5	656.3		486.1	587.5	656.3
...	...	503	Punkte	...	307	494

Nullpunkte der Spektren

	λ [nm]		λ [nm]	
.....	471.5		474.7	
.....			474.8	

Mittelwerte der Nullpunkte

λ [nm]	λ [nm]
471.5	474.8
.....	

Lage der Bereiche

185	200	215	R1: 545 nm	176	191	206
362	377	392		353	368	383
553	568	583	R2: 610 nm	544	559	574
.....			R3: 680 nm			

Mittelwerte der Bereiche

	R1	
2.7148		2.6953
1.2694	R2	1.2854
0.5172	R3	0.5245
.....		

Bereichkombination	T(Lyr)	T(β Lyr)
R1/R2	 K	 K
R1/R3	 K	47730 K
R2/R3	 K	 K

Lage der Linien

H γ	H β	HeI	H α	λ [nm]	H γ	H β	HeI	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
361	497	...	944		(377)	497	750	931

Nullpunkte der Spektren				λ [nm]	Mittelwerte der Nullpunkte			
297.0	297.5		298.1		(291.0)	299.1	303.0	303.1
	297.6						301.7	

Lage der Bereiche

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
308	323	338	353	368	383	398
426	441	456	471	486	501	516
545	560	575	590	605	620	635
656	665	680	695	710	725	740
795	810	825	840	855	870	885
861	876	891	906	921	936	951
967	982	997				

Mittelwerte der Bereiche

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
1.9196	2.6873	2.0471	1.3826	0.6078	0.3844	0.1709
1.5335	2.6546	2.1100	1.3832	0.6300	0.4424	0.2203

Bereichkomb.	T(Lyr)	T(β Lyr)	Bereichkomb.	T(Lyr)	T(β Lyr)
B1/B2		K 8950	B3/B4		K 23730
B1/B3		K 12660	B3/B5		K
B1/B4		K 14940	B3/B6		K 33270
B1/B5		K 22300	B3/B7		K 36500
B1/B6		K 18020	B4/B5		K
B1/B7		K 19000	B4/B6		K 40420
B2/B3		K 27780	B4/B7		K 34560
B2/B4		K 26190	B5/B6		K 6040
B2/B5		K 19800	B5/B7		K 10280
B2/B6		K 31610	B6/B7		K 24000
B2/B7		K 16830

Lage der Linien

H β	HeI	H α	λ [nm]	H β	HeI	H α
486.1	587.5	656.3	Punkte	486.1	587.5	656.3
...	...	...		...	...	...

Nullpunkte der Spektren

.....		473.7	λ [nm]		473.6	473.7
.....						

Mittelwerte der Nullpunkte
 λ [nm]

473.7	473.7
.....	

Lage der Bereiche

179	194	209	R1: 545 nm	179	194	209
...	...	...	R2: 610 nm	...	...	...
...	...	...	R3: 680 nm	...	...	...
...	...	...		...	...	...

Mittelwerte der Bereiche

2.7441	R1	2.6800
1.3087	R2	1.3036
0.5343	R3	0.5513
.....		

Bereichkombination	T(Lyr)	T(β Lyr)
R1/R2	 K	 K
R1/R3	 K	31610 K
R2/R3	 K	24770 K

Lage der Linien

H γ	H β	He I	H α	λ [nm]	H γ	H β	He I	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
368	504	...	950	Punkte	(374)	504	769	950

Nullpunkte der Spektren

	λ [nm]		λ [nm]
294.4	294.9	...	295.9
	295.1		(292.1)
			294.9
			295.7
			295.9
			295.5

Mittelwerte der Nullpunkte
 λ [nm]

Lage der Bereiche

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
314 - 329	329 - 344	313 - 328	328 - 343	420 nm	432 - 447	447 - 462
433 - 448	448 - 463	432 - 447	447 - 462	465 nm	550 - 565	565 - 580
551 - 566	566 - 581	550 - 565	565 - 580	510 nm	656 - 671	671 - 686
657 - 672	672 - 687	656 - 671	671 - 686	550 nm	801 - 816	816 - 831
802 - 817	817 - 832	801 - 816	816 - 831	605 nm	867 - 882	882 - 897
868 - 883	883 - 898	867 - 882	882 - 897	630 nm	977 - 992	992 - 1007
973 - 988	988 - 1003	977 - 992	992 - 1007	670 nm		

Mittelwerte der Bereiche

1.6788	B1	1.8111
2.8169	B2	2.6856
2.0979	B3	1.9957
1.2640	B4	1.2506
0.5756	B5	0.5865
0.3788	B6	0.3914
0.1839	B7	0.1753

Bereichkomb.

- B1/B2
- B1/B3
- B1/B4
- B1/B5
- B1/B6
- B1/B7
- B2/B3
- B2/B4
- B2/B5
- B2/B6
- B2/B7

T(β Lyr)

- K
- 109400 K
- 45840 K
- 68630 K
- 58630 K
- 27920 K

Bereichkomb.

- B3/B4
- B3/B5
- B3/B6
- B3/B7
- B4/B5
- B4/B6
- B4/B7
- B5/B6
- B5/B7
- B6/B7

T(β Lyr)

- 26010 K
- 54850 K
- 45980 K
- K
- K
- 74780 K
- K
- 22000 K
- K
- K

Lage der Linien						
H β	He I	H α	λ [nm]	H β	He I	H α
486.1	587.5	656.3		486.1	587.5	656.3
.....			Punkte			
Nullpunkte der Spektren						
.....		471.5	λ [nm]		471.0	471.5
Mittelwerte der Nullpunkte						
	471.5		λ [nm]		471.3	
Lage der Bereiche						
185	200	215	R1: 545 nm	186	201	216
362	377	392	R2: 610 nm	363	378	393
553	568	583	R3: 680 nm	553	568	583
Mittelwerte der Bereiche						
279.97			R1	262.51		
369.8			R2	375.79		
551.31			R3	572.95		
Bereichkombination			T(β Lyr)			
R1/R2			66570		K	
R1/R3			22870		K	
R2/R3			22800		K

Lage der Linien

H γ	H β	HeI	H α	λ [nm]	H γ	H β	HeI	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
362	497	...	943	Punkte	...	(501)	754	935

Nullpunkte der Spektren

296.7	304.4		298.5	λ [nm]	 (296.0)	301.4	301.6
.....	299.9			Mittelwerte der Nullpunkte		301.5	
.....				λ [nm]			

Lage der Bereiche

302	-	317	-	333	B1: 420 nm	297	-	312	-	327
420	-	435	-	450	B2: 465 nm	416	-	431	-	446
539	-	554	-	569	B3: 510 nm	535	-	550	-	565
644	-	659	-	674	B4: 550 nm	640	-	655	-	670
789	-	804	-	819	B5: 605 nm	785	-	800	-	815
855	-	870	-	885	B6: 630 nm	851	-	866	-	881
960	-	975	-	990	B7: 670 nm	956	-	971	-	986

Mittelwerte der Bereiche

1.4750	B1	1.7077	!
2.7326	B2	2.5870	
2.1471	B3	2.0612	
1.3836	B4	1.3500	
0.6335	B5	0.6529	
0.4215	B6	0.4459	
0.2084	B7	0.2175	

Bereichkomb.

- B1/B2
- B1/B3
- B1/B4
- B1/B5
- B1/B6
- B1/B7
- B2/B3
- B2/B4
- B2/B5
- B2/B6
- B2/B7

T(β Lyr)

- K!
- 51300 K
- 51530 K
- 52510 K
- 42640 K
- 19630 K

Bereichkomb.

- B3/B4
- B3/B5
- B3/B6
- B3/B7
- B4/B5
- B4/B6
- B4/B7
- B5/B6
- B5/B7
- B6/B7

T(β Lyr)

- 48500 K
- 51480 K
- 38080 K
- 40540 K
- 52240 K
- 30850 K
- 35070 K
- 15610 K
- 25370 K
- 46660 K

Lage der Linien

Hβ	HeI	Hα	λ [nm]	Hβ	HeI	Hα
486.1	587.5	656.3	Punkte	486.1	587.5	656.3
.....						

Nullpunkte der Spektren

.....		472.2	λ [nm]		475.4	475.9
.....						

Mittelwerte der Nullpunkte
λ [nm]

472.2	475.7
.....	

Lage der Bereiche

183	-	198	-	213	R1: 545 nm	174	-	189	-	204
.....										
367	-	375	-	390	R2: 610 nm	351	-	366	-	381
.....										
551	-	566	-	581	R3: 680 nm	541	-	556	-	571
.....										

Mittelwerte der Bereiche

2.7573	R1	2.6550
1.2451	R2	1.3038
0.5129	R3	0.5655
.....		

Bereichkombination

R1/R2
R1/R3
R2/R3

T(βLyr)

31050 K
18290 K
19800 K

Lage der Linien

H γ	H β	HeI	H α	λ [nm]	H γ	H β	HeI	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
367	502.5	...	948	Punkte	...	506	771	951

Nullpunkte der Spektren				λ [nm]	Nullpunkte der Spektren			
294.8	295.5		296.6		294.1	295.0	295.5	
.....				Mittelwerte der Nullpunkte				
.....	295.6			λ [nm]		294.9		

Lage der Bereiche

313	328	343	B1: 420 nm	315	330	345
421	446	461	B2: 465 nm	433	448	463
530	565	580	B3: 510 nm	553	567	582
656	671	686	B4: 550 nm	657	672	687
805	815	830	B5: 605 nm	802	817	832
866	881	896	B6: 630 nm	868	883	898
972	987	1002	B7: 670 nm	974	989	1004

Mittelwerte der Bereiche

1.4403	B1	1.7788
2.4483	B2	2.6727
2.3357	B3	2.0133
1.4651	B4	1.2962
0.6562	B5	0.6070
0.4435	B6	0.4019
0.1748	B7	0.2079

Bereichkomb.	T(Lyr)	T(β Lyr)	Bereichkomb.	T(Lyr)	T(β Lyr)
B1/B2	 K	 K	B3/B4	 K	35130 K
B1/B3	 K	 K	B3/B5	 K	51900 K
B1/B4	 K	 K	B3/B6	 K	89750 K
B1/B5	 K	 K	B3/B7	 K	13240 K
B1/B6	 K	 K	B4/B5	 K	86860 K
B1/B7	 K	 K	B4/B6	 K	 K
B2/B3	 K	 K	B4/B7	 K	10440 K
B2/B4	 K	 K	B5/B6	 K	 K
B2/B5	 K	 K	B5/B7	 K	6000 K
B2/B6	 K	 K	B6/B7	 K	3780 K
B2/B7	 K	 K

Lage der Linien

Hβ	HeI	Hα	λ [nm]	Hβ	HeI	Hα
486.1	587.5	656.3	Punkte	486.1	587.5	656.3
.....						

Nullpunkte der Spektren

.....		471.5	λ [nm]		474.3	473.3
.....						

Mittelwerte der Nullpunkte

471.5	λ [nm]	473.8
.....		

Lage der Bereiche

185	-	200	-	215	R1: 545 nm	179	-	194	-	209
363	-	377	-	392	R2: 610 nm	356	-	371	-	386
553	-	568	-	583	R3: 680 nm	546	-	561	-	576
.....										

Mittelwerte der Bereiche

2.9641	R1	2.7329
1.4495	R2	1.2681
0.4239	R3	0.4679
.....		

Bereichkombination	T(Lyr)	T(βLyr)
R1/R2	 K	 K
R1/R3	 K	15040 K
R2/R3	 K	7000 K

Lage der Linien

H γ	H β	HeI	H α	λ [nm]	H γ	H β	HeI	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
361	496	...	943	Punkte	...	495	759	941

Nullpunkte der Spektren

297.0	297.9		298.5	λ [nm]		298.3	299.5	299.3
	297.8			Mittelwerte der Nullpunkte			299.0	

Lage der Bereiche

307	-	322	-	337	B1: 420 nm	304	-	319	-	334
426	-	441	-	456	B2: 465 nm	423	-	438	-	453
544	-	559	-	574	B3: 510 nm	541	-	556	-	571
650	-	665	-	680	B4: 550 nm	647	-	662	-	677
785	-	810	-	825	B5: 605 nm	792	-	807	-	822
861	-	876	-	891	B6: 630 nm	857	-	872	-	887
966	-	981	-	996	B7: 670 nm	963	-	978	-	993

Mittelwerte der Bereiche

2.0559	B1	1.6586
2.7412	B2	2.6568
3.0460	B3	2.0833
1.2428	B4	1.2792
0.5535	B5	0.6022
0.3586	B6	0.3949
0.1739	B7	0.1444

Bereichkomb.

B1/B2	9450	K
B1/B3	13420	K
B1/B4	17220	K
B1/B5	19850	K
B1/B6	20790	K
B1/B7	20810	K
B2/B3	24770	K
B2/B4	38660	K
B2/B5	42370	K
B2/B6	43550	K
B2/B7	17870	K

Bereichkomb.

B3/B4	62380	K
B3/B5	56880	K
B3/B6	55780	K
B3/B7	36960	K
B4/B5	50900	K
B4/B6	45550	K
B4/B7	31620	K
B5/B6	33840	K
B5/B7	72860	K
B6/B7		K

T(β Lyr)

T(β Lyr)

Lage der Linien

H β	He I	H α	λ [nm]	H β	He I	H α
486.1	587.5	656.3		486.1	587.5	656.3
.....			Punkte			

.....			Nullpunkte der Spektren			
		474.1	λ [nm]		474.7	474.8

.....			Mittelwerte der Nullpunkte			
	474.1		λ [nm]		474.8	

Lage der Bereiche

178	-	193	-	208	176	-	191	-	206
355	-	370	-	385	353	-	368	-	383
545	-	560	-	575	544	-	559	-	574

Mittelwerte der Bereiche

2.7138	R1	2.7678
1.2437	R2	1.2307
0.5162	R3	0.5285

Bereichkombination

R1/R2
R1/R3
R2/R3

T(β Lyr)

..... K
47240 K
46670 K

Lage der Linien

H γ	H β	HeI	H α	λ [nm]	H γ	H β	HeI	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
364	500	...	447	Punkte	...	492	757	938

Nullpunkte der Spektren

	λ [nm]		λ [nm]		λ [nm]
295.9	296.4		297.0		299.4
	296.4				300.3
					300.4
					300.1

Lage der Bereiche

311	-	326	-	341	B1: 420 nm	301	-	316	-	331
429	-	444	-	459	B2: 465 nm	420	-	435	-	450
548	-	563	-	578	B3: 510 nm	538	-	553	-	568
653	-	668	-	683	B4: 550 nm	644	-	659	-	674
798	-	813	-	828	B5: 605 nm	789	-	804	-	819
864	-	879	-	894	B6: 630 nm	855	-	870	-	885
970	-	985	-	1000	B7: 670 nm	960	-	975	-	990

Mittelwerte der Bereiche

2.1809	B1	1.7379
2.7913	B2	2.7041
2.0371	B3	2.0585
1.2177	B4	1.2528
0.5006	B5	0.5878
0.3132	B6	0.3838
0.1479	B7	0.1927

Bereichkomb.

Bereichkomb.	T(β Lyr)
B1/B2	9420 K
B1/B3	13230 K
B1/B4	16640 K
B1/B5	16200 K
B1/B6	15840 K
B1/B7	15260 K
B2/B3	27880 K
B2/B4	33780 K
B2/B5	23470 K
B2/B6	21330 K
B2/B7	12710 K

Bereichkomb.

Bereichkomb.	T(β Lyr)
B3/B4	39440 K
B3/B5	21640 K
B3/B6	18820 K
B3/B7	16040 K
B4/B5	14780 K
B4/B6	13740 K
B4/B7	12510 K
B5/B6	11500 K
B5/B7	10670 K
B6/B7	10060 K

Lage der Linien

H β	HeI	H α	λ [nm]	H β	HeI	H α
486.1	587.5	656.3		486.1	587.5	656.3
.....		500	Punkte		313	500

Nullpunkte der Spektren

.....		472.6	λ [nm]		472.5	472.6
-------	-------	-------	----------------	-------	-------	-------

Mittelwerte der Nullpunkte
 λ [nm]

472.6	472.6
-------	-------

Lage der Bereiche

182	197	212	R1: 545 nm	182	197	212
359	374	389	R2: 610 nm	359	374	389
550	565	580	R3: 680 nm	550	565	580

Mittelwerte der Bereiche

2.8298	R1	2.6616
1.2432	R2	1.2066
0.4759	R3	0.5264

Bereichkombination

R1/R2
R1/R3
R2/R3

T(β Lyr)

..... K
16180 K
10630 K

Lage der Linien

H γ	H β	He I	H α	λ [nm]	H γ	H β	He I	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
3.06	4.41	—	8.87		—	4.42	7.87	8.89

Nullpunkte der Spektren				λ [nm]	Mittelwerte der Nullpunkte			
317.9	318.8	—	319.8		—	318.4	319.3	319.0
318.8	—	—	—		—	—	318.9	—

Lage der Bereiche

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
420 nm	465 nm	510 nm	550 nm	605 nm	630 nm	670 nm

Mittelwerte der Bereiche

Bereich	Mittelwert
B1	254.0
B2	372.0
B3	491.0
B4	596.0
B5	741.0
B6	807.0
B7	913.0

Bereichkomb.

Bereichkomb.	T(β Lyr)
B1/B2	132.80 K
B1/B3	160.00 K
B1/B4	198.50 K
B1/B5	224.50 K
B1/B6	248.50 K
B1/B7	219.80 K
B2/B3	303.30 K
B2/B4	254.10 K
B2/B5	297.80 K
B2/B6	355.10 K
B2/B7	153.20 K

Bereichkomb.

Bereichkomb.	T(β Lyr)
B3/B4	383.20 K
B3/B5	426.80 K
B3/B6	598.80 K
B3/B7	280.60 K
B4/B5	458.60 K
B4/B6	740.00 K
B4/B7	240.20 K
B5/B6	— K
B5/B7	161.30 K
B6/B7	99.70 K

Lage der Linien

Hβ	He I	Hα	λ [nm]	Hβ	He I	Hα
486.1	587.5	656.3		486.1	587.5	656.3
.....		448	Punkte		254	448

Nullpunkte der Spektren

.....		494.6	λ [nm]		494.2	493.9
-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

Mittelwerte der Nullpunkte

494.6	λ [nm]	494.0
-------	--------	-------

Lage der Bereiche

122 - 127 - 152	R1: 545 nm	124 - 139 - 154
298 - 314 - 339	R2: 610 nm	391 - 316 - 331
490 - 505 - 520	R3: 680 nm	491 - 506 - 521

Mittelwerte der Bereiche

218640	R1	27610
12362	R2	13331
05256	R3	05358

Bereichkombination

R1/R2	T(βLyr)
R1/R3	33120 K
R2/R3	31330 K
	 K

Lage der Linien

H γ	H β	He I	H α	λ [nm]	H γ	H β	He I	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
366	501	...	948	Punkte	...	496	761	943

Nullpunkte der Spektren

				λ [nm]				
295.1	296.0		296.6			297.9	298.8	298.5
	295.9			Mittelwerte der Nullpunkte			298.4	
				λ [nm]				

Lage der Bereiche

312	-	327	-	342	306	-	321	-	336
431	-	446	-	461	424	-	439	-	454
549	-	564	-	579	543	-	558	-	573
625	-	670	-	685	648	-	663	-	678
800	-	815	-	830	793	-	808	-	823
866	-	881	-	896	859	-	874	-	889
971	-	986	-	1001	964	-	979	-	994

Mittelwerte der Bereiche

1.9062	B1	1.6325
2.6724	B2	2.6360
2.0588	B3	2.8864
1.2837	B4	1.3429
0.5814	B5	0.6458
0.3889	B6	0.4345
0.1968	B7	0.2216

Bereichkomb.

Bereichkomb.	T(β Lyr)	
B1/B2	11490	K
B1/B3	16270	K
B1/B4	19590	K
B1/B5	22100	K
B1/B6	22980	K
B1/B7	23680	K
B2/B3	34970	K
B2/B4	32470	K
B2/B5	36520	K
B2/B6	37510	K
B2/B7	17730	K

Bereichkomb.

Bereichkomb.	T(β Lyr)	
B3/B4	30500	K
B3/B5	36720	K
B3/B6	37890	K
B3/B7	33390	K
B4/B5	43690	K
B4/B6	39930	K
B4/B7	32560	K
B5/B6	31000	K
B5/B7	24920	K
B6/B7	21500	K

Lage der Linien

Hβ	HeI	Hα		Hβ	HeI	Hα
486.1	587.5	656.3	λ [nm]	486.1	587.5	656.3
.....		502	Punkte		316	502

Nullpunkte der Spektren

.....		471.9	λ [nm]		471.4	471.9
-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

Mittelwerte der Nullpunkte

471.9	λ [nm]	471.6
-------	--------	-------

Lage der Bereiche

184	-	199	-	214	R1: 545 nm	185	-	200	-	215
361	-	376	-	391	R2: 610 nm	362	-	377	-	392
551	-	566	-	581	R3: 680 nm	552	-	567	-	582

Mittelwerte der Bereiche

2.7311	R1	2.6324
1.2543	R2	1.2287
0.5181	R3	0.5380

Bereichkombination

R1/R2
R1/R3
R2/R3

T(β Lyr)

..... K
26850 K
18340 K

Lage der Linien

H γ	H β	HeI	H α	λ [nm]	H γ	H β	HeI	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
362	498	...	944	Punkte	...	493	758	939

Nullpunkte der Spektren				λ [nm]	Nullpunkte			
296.7	297.2		298.1		299.1	299.9	300.0	
Mittelwerte der Nullpunkte				λ [nm]				
				297.3	299.7			

Lage der Bereiche

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
302	420	510	550	605	630	670
317	442	539	576	645	656	746
332	457	569	681	790	856	961
347	472	584	726	805	871	976
362	487	599	781	820	886	991
377	502	614	836	835	901	1006
392	517	629	891	850	916	1021
407	532	644	946	865	931	1036
422	547	659	1001	880	946	1051
437	562	674	1056	895	961	1066
452	577	689	1111	910	976	1081
467	592	704	1166	925	991	1096
482	607	719	1221	940	1006	1111
497	622	734	1276	955	1021	1126
512	637	749	1331	970	1036	1141
527	652	764	1386	985	1051	1156
542	667	779	1441	1000	1066	1171
557	682	794	1496	1015	1081	1186
572	697	809	1551	1030	1096	1201
587	712	824	1606	1045	1111	1216
602	727	839	1661	1060	1126	1231
617	742	854	1716	1075	1141	1246
632	757	869	1771	1090	1156	1261
647	772	884	1826	1105	1171	1276
662	787	899	1881	1120	1186	1291
677	802	914	1936	1135	1201	1306
692	817	929	1991	1150	1216	1321
707	832	944	2046	1165	1231	1336
722	847	959	2101	1180	1246	1351
737	862	974	2156	1195	1261	1366
752	877	989	2211	1210	1276	1381
767	892	1004	2266	1225	1291	1396
782	907	1019	2321	1240	1306	1411
797	922	1034	2376	1255	1321	1426
812	937	1049	2431	1270	1336	1441
827	952	1064	2486	1285	1351	1456
842	967	1079	2541	1300	1366	1471
857	982	1094	2596	1315	1381	1486
872	997	1109	2651	1330	1396	1501
887	1012	1124	2706	1345	1411	1516
902	1027	1139	2761	1360	1426	1531
917	1042	1154	2816	1375	1441	1546
932	1057	1169	2871	1390	1456	1561
947	1072	1184	2926	1405	1471	1576
962	1087	1199	2981	1420	1486	1591
977	1102	1214	3036	1435	1501	1606
992	1117	1229	3091	1450	1516	1621
1007	1132	1244	3146	1465	1531	1636
1022	1147	1259	3201	1480	1546	1651
1037	1162	1274	3256	1495	1561	1666
1052	1177	1289	3311	1510	1576	1681
1067	1192	1304	3366	1525	1591	1696
1082	1207	1319	3421	1540	1606	1711
1097	1222	1334	3476	1555	1621	1726
1112	1237	1349	3531	1570	1636	1741
1127	1252	1364	3586	1585	1651	1756
1142	1267	1379	3641	1600	1666	1771
1157	1282	1394	3696	1615	1681	1786
1172	1297	1409	3751	1630	1696	1801
1187	1312	1424	3806	1645	1711	1816
1202	1327	1439	3861	1660	1726	1831
1217	1342	1454	3916	1675	1741	1846
1232	1357	1469	3971	1690	1756	1861
1247	1372	1484	4026	1705	1771	1876
1262	1387	1499	4081	1720	1786	1891
1277	1402	1514	4136	1735	1801	1906
1292	1417	1529	4191	1750	1816	1921
1307	1432	1544	4246	1765	1831	1936
1322	1447	1559	4301	1780	1846	1951
1337	1462	1574	4356	1795	1861	1966
1352	1477	1589	4411	1810	1876	1981
1367	1492	1604	4466	1825	1891	1996
1382	1507	1619	4521	1840	1906	2011
1397	1522	1634	4576	1855	1921	2026
1412	1537	1649	4631	1870	1936	2041
1427	1552	1664	4686	1885	1951	2056
1442	1567	1679	4741	1900	1966	2071
1457	1582	1694	4796	1915	1981	2086
1472	1597	1709	4851	1930	1996	2101
1487	1612	1724	4906	1945	2011	2116
1502	1627	1739	4961	1960	2026	2131
1517	1642	1754	5016	1975	2041	2146
1532	1657	1769	5071	1990	2056	2161
1547	1672	1784	5126	2005	2071	2176
1562	1687	1799	5181	2020	2086	2191
1577	1702	1814	5236	2035	2101	2206
1592	1717	1829	5291	2050	2116	2221
1607	1732	1844	5346	2065	2131	2236
1622	1747	1859	5401	2080	2146	2251
1637	1762	1874	5456	2095	2161	2266
1652	1777	1889	5511	2110	2176	2281
1667	1792	1904	5566	2125	2191	2296
1682	1807	1919	5621	2140	2206	2311
1697	1822	1934	5676	2155	2221	2326
1712	1837	1949	5731	2170	2236	2341
1727	1852	1964	5786	2185	2251	2356
1742	1867	1979	5841	2200	2266	2371
1757	1882	1994	5896	2215	2281	2386
1772	1897	2009	5951	2230	2296	2401
1787	1912	2024	6006	2245	2311	2416
1802	1927	2039	6061	2260	2326	2431
1817	1942	2054	6116	2275	2341	2446
1832	1957	2069	6171	2290	2356	2461
1847	1972	2084	6226	2305	2371	2476
1862	1987	2099	6281	2320	2386	2491
1877	2002	2114	6336	2335	2401	2506
1892	2017	2129	6391	2350	2416	2521
1907	2032	2144	6446	2365	2431	2536
1922	2047	2159	6501	2380	2446	2551
1937	2062	2174	6556	2395	2461	2566
1952	2077	2189	6611	2410	2476	2581
1967	2092	2204	6666	2425	2491	2596
1982	2107	2219	6721	2440	2506	2611
1997	2122	2234	6776	2455	2521	2626
2012	2137	2249	6831	2470	2536	2641
2027	2152	2264	6886	2485	2551	2656
2042	2167	2279	6941	2500	2566	2671
2057	2182	2294	6996	2515	2581	2686
2072	2197	2309	7051	2530	2596	2701
2087	2212	2324	7106	2545	2611	2716
2102	2227	2339	7161	2560	2626	2731
2117	2242	2354	7216	2575	2641	2746
2132	2257	2369	7271	2590	2656	2761
2147	2272	2384	7326	2605	2671	2776
2162	2287	2399	7381	2620	2686	2791
2177	2302	2414	7436	2635	2701	2806
2192	2317	2429	7491	2650	2716	2821
2207	2332	2444	7546	2665	2731	2836
2222	2347	2459	7601	2680	2746	2851
2237	2362	2474	7656	2695	2761	2866
2252	2377	2489	7711	2710	2776	2881
2267	2392	2504	7766	2725	2791	2896
2282	2407	2519	7821	2740	2806	2911
2297	2422	2534	7876	2755	2821	2926
2312	2437	2549	7931	2770	2836	2941
2327	2452	2564	7986	2785	2851	2956
2342	2467	2579	8041	2800	2866	2971
2357	2482	2594	8096	2815	2881	2986
2372	2497	2609	8151	2830	2896	3001
2387	2512	2624	8206	2845	2911	3016
2402	2527	2639	8261	2860	2926	3031
2417	2542	2654	8316	2875	2941	3046
2432	2557	2669	8371	2890	2956	3061
2447	2572	2684	8426	2905	2971	3076
2462	2587	2699	8481	2920	2986	3091
2477	2602	2714	8536	2935	3001	3106
2492	2617	2729	8591	2950	3016	3121
2507	2632	2744	8646	2965	3031

Lage der Linien

Hβ	HeI	Hα	λ [nm]	Hβ	HeI	Hα
486.1	587.5	656.3	Punkte	486.1	587.5	656.3
.....		500			3!!	499

.....		478.6	Nullpunkte der Spektren		473.4	473.0
			λ [nm]			

.....	472.6	Mittelwerte der Nullpunkte	λ [nm]	473.1
-------	-------	----------------------------	--------	-------

Lage der Bereiche

182	- 197	- 212	R1: 545 nm	181	- 196	- 211
259	- 374	- 389	R2: 610 nm	358	- 373	- 388
550	- 565	- 580	R3: 680 nm	548	- 563	- 578

2.6854	Mittelwerte der Bereiche	2.5445
1.3741	R1	1.3310
0.3706	R2	0.6299
	R3	

Bereichkombination	T(β Lyr)
R1/R2	2.5990 K
R1/R3	.6370 K
R2/R3	.3940 K

Lage der Linien

H γ	H β	HeI	H α	λ [nm]	H γ	H β	HeI	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
302	497	...	944	Punkte	...	482	748	930

Nullpunkte der Spektren

296.7	297.5		318.1	λ [nm]		303.2	303.7	303.5
	297.4			Mittelwerte der Nullpunkte				
				λ [nm]		303.5		

Lage der Bereiche

308	-	323	-	338	B1: 420 nm	292	-	307	-	322
427	-	442	-	457	B2: 465 nm	411	-	426	-	441
545	-	560	-	575	B3: 510 nm	529	-	544	-	559
651	-	666	-	681	B4: 550 nm	635	-	650	-	665
796	-	811	-	826	B5: 605 nm	780	-	795	-	810
862	-	877	-	892	B6: 630 nm	846	-	861	-	876
967	-	982	-	997	B7: 670 nm	951	-	966	-	981

Mittelwerte der Bereiche

2.0539	B1	1.5374
2.7169	B2	2.6614
2.0121	B3	2.1119
1.2436	B4	1.3365
0.5663	B5	0.6283
0.3712	B6	0.4083
0.1767	B7	0.2055

Bereichkomb.

Bereichkomb.	T(β Lyr)	K
B1/B2	7700	K
B1/B3	10530	K
B1/B4	13070	K
B1/B5	16010	K
B1/B6	17270	K
B1/B7	16580	K
B2/B3	20030	K
B2/B4	25050	K
B2/B5	35580	K
B2/B6	40910	K
B2/B7	16210	K

Bereichkomb.

Bereichkomb.	T(β Lyr)	K
B3/B4	37360	K
B3/B5	75000	K
B3/B6	98700	K
B3/B7	34880	K
B4/B5		K
B4/B6		K
B4/B7	30722	K
B5/B6		K
B5/B7	16280	K
B6/B7	10600	K

Lage der Linien

Hβ	He I	Hα	λ [nm]	Hβ	He I	Hα
486.1	587.5	656.3		486.1	587.5	656.3
.....		497	Punkte		387	494

Nullpunkte der Spektren

.....		473.7	λ [nm]		474.7	474.8
-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

Mittelwerte der Nullpunkte

.....	473.7		λ [nm]		474.8	
-------	-------	--	--------	-------	-------	--

Lage der Bereiche

179	194	209	R1: 545 nm	176	191	206
356	371	386	R2: 610 nm	353	368	383
547	562	577	R3: 680 nm	544	559	574

Mittelwerte der Bereiche

2.7563			R1	2.7037
1.2735			R2	1.2444
0.4833			R3	0.5289

Bereichkombination

R1/R2	T(βLyr)
R1/R3	 K
R2/R3	21030 K
	11740 K

Lage der Linien

H γ	H β	HeI	H α	λ [nm]	H γ	H β	HeI	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
363	448	...	446	Punkte	...	502	767	948

Nullpunkte der Spektren

296.3	297.2		297.4	λ [nm]		295.6	296.5	296.6
	296.9			Mittelwerte der Nullpunkte			296.3	

Lage der Bereiche

309	324	339	B1: 420 nm	311	326	341
428	443	458	B2: 465 nm	430	445	460
547	562	577	B3: 510 nm	548	563	578
652	667	682	B4: 550 nm	654	669	684
757	772	787	B5: 605 nm	759	774	789
863	878	893	B6: 630 nm	865	880	895
968	983	998	B7: 670 nm	970	985	1000

Mittelwerte der Bereiche

1.8982	B1	1.8846
2.16960	B2	2.15842
2.36946	B3	2.30126
1.26900	B4	1.2739
0.5614	B5	0.6153
0.3580	B6	0.4112
0.1830	B7	0.2626

Bereichkomb.

B1/B2	58660 K
B1/B3	79190 K
B1/B4	63670 K
B1/B5	45850 K
B1/B6	36170 K
B1/B7	18980 K
B2/B3	83880 K
B2/B4	40060 K
B2/B5	33030 K
B2/B6	26970 K
B2/B7	10810 K

Bereichkomb.

B3/B4	24000 K
B3/B5	24260 K
B3/B6	20250 K
B3/B7	11080 K
B4/B5	24110 K
B4/B6	17700 K
B4/B7	8990 K
B5/B6	8680 K
B5/B7	5720 K
B6/B7	4360 K

T(β Lyr)

Lage der Linien

Hβ	He I	Hα	λ [nm]	Hβ	He I	Hα
486.1	587.5	656.3		486.1	587.5	656.3
.....		500	Punkte		312	499

Nullpunkte der Spektren

.....		472.6	λ [nm]		472.9	473.0
-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

Mittelwerte der Nullpunkte

.....	472.6	λ [nm]		472.9
-------	-------	--------	-------	-------

Lage der Bereiche

182	-	197	-	212	181	-	196	-	211
359	-	374	-	389	358	-	373	-	388
550	-	565	-	580	549	-	564	-	579

Mittelwerte der Bereiche

2.7212	R1	2.6578
1.2779	R2	1.3021
0.5040	R3	0.5368

Bereichkombination

R1/R2

R1/R3

R2/R3

T(βLyr)

..... K

24340 K

21720 K

Lage der Linien

H γ	H β	HeI	H α	λ [nm]	H γ	H β	HeI	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
360	495	...	942	Punkte	...	490	756	937

Nullpunkte der Spektren

λ [nm]	λ [nm]	λ [nm]
297.4	298.3	...
298.2	...	...
...	300.2	300.7
...	300.8	...
...	...	300.6

Mittelwerte der Nullpunkte

Lage der Bereiche

304	371	336	B1: 420 nm	300	315	320
425	440	455	B2: 465 nm	410	433	448
513	558	523	B3: 510 nm	537	552	567
649	664	679	B4: 550 nm	642	657	672
794	809	824	B5: 605 nm	787	802	817
869	875	870	B6: 630 nm	853	868	883
965	980	995	B7: 670 nm	959	974	989

Mittelwerte der Bereiche

1.7816	B1	1.6585
2.6662	B2	2.5595
2.1246	B3	2.0840
1.2461	B4	1.3853
0.6324	B5	0.6722
0.4284	B6	0.4572
0.2079	B7	0.2248

Bereichkomb.

Bereichkomb.	T(β Lyr)	K
B1/B2	21.310	K
B1/B3	28.830	K
B1/B4	29.900	K
B1/B5	36.500	K
B1/B6	37.900	K
B1/B7	36.410	K
B2/B3	44.010	K
B2/B4	30.640	K
B2/B5	42.440	K
B2/B6	44.620	K
B2/B7	18.480	K

Bereichkomb.

Bereichkomb.	T(β Lyr)	K
B3/B4	21.590	K
B3/B5	40.410	K
B3/B6	43.350	K
B3/B7	34.940	K
B4/B5	26.7620	K
B4/B6	105.320	K
B4/B7	45.100	K
B5/B6	60.000	K
B5/B7	34.440	K
B6/B7	19.080	K

			Lage der Linien			
Hβ	HeI	Hα	λ [nm]	Hβ	HeI	Hα
486.1	587.5	656.3		486.1	587.5	656.3
.....		495	Punkte		306	493
			Nullpunkte der Spektren			
.....		474.4	λ [nm]		475.1	475.2
			Mittelwerte der Nullpunkte			
			λ [nm]	475.1		
			Lage der Bereiche			
177	192	207	R1: 545 nm	175	190	205
.....			R2: 610 nm			
354	369	384	R3: 680 nm	352	367	382
.....						
431	560	425		543	558	573
.....						
			Mittelwerte der Bereiche			
2.4080			R1	2.6268		
1.2349			R2	1.3554		
0.5660			R3	0.5133		
Bereichkombination			T(βLyr)			
R1/R2				36000 K		
R1/R3				26040 K		
R2/R3				57620 K

Lage der Linien

H γ	H β	HeI	H α	λ [nm]	H γ	H β	HeI	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
361	444	...	444	Punkte	...	...	756	436

Nullpunkte der Spektren

	λ [nm]		λ [nm]
297.0	297.5	...	298.1
...	...	...	...
...	297.6	...	300.7
...	...	...	301.2
...	...	...	300.9

Lage der Bereiche

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
300.8	420 nm	323	465 nm	338	510 nm	299	314
426	441	456	456 nm	418	550 nm	418	433
545	560	575	536	536	605 nm	536	551
670	685	685	642	642	630 nm	642	657
795	810	825	787	787	670 nm	787	802
861	876	891	852	852		852	867
967	982	997	958	958		958	973

Mittelwerte der Bereiche

Bereich	Mittelwert
B1	1.2999
B2	2.6622
B3	3.1594
B4	1.4287
B5	0.6808
B6	0.4585
B7	1.2276

Bereichkomb.	T(Lyr)	T(β Lyr)	Bereichkomb.	T(Lyr)	T(β Lyr)
B1/B2	 K	7870 K	B3/B4	 K	65800 K
B1/B3	 K	11670 K	B3/B5	 K	 K
B1/B4	 K	14950 K	B3/B6	 K	913300 K
B1/B5	 K	18950 K	B3/B7	 K	52000 K
B1/B6	 K	20370 K	B4/B5	 K	 K
B1/B7	 K	19660 K	B4/B6	 K	 K
B2/B3	 K	35040 K	B4/B7	 K	 K
B2/B4	 K	44560 K	B5/B6	 K	93210 K
B2/B5	 K	82330 K	B5/B7	 K	18660 K
B2/B6	 K	74940 K	B6/B7	 K	13510 K
B2/B7	 K	 K

Lage der Linien

Hβ	He I	Hα		Hβ	He I	Hα
486.1	587.5	656.3	λ [nm]	486.1	587.5	656.3
.....		497	Punkte		385	493

Nullpunkte der Spektren

.....		473.7	λ [nm]		475.4	475.2
-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

Mittelwerte der Nullpunkte

473.7	λ [nm]	475.3
-------	--------	-------

Lage der Bereiche

177	-	194	-	209	175	-	190	-	205
336	-	341	-	386	352	-	367	-	382
547	-	562	-	577	542	-	557	-	572

Mittelwerte der Bereiche

2.6927	R1	2.6197
1.3052	R2	1.3419
0.5563	R3	0.5476

Bereichkombination

R1/R2
R1/R3
R2/R3

T(Lyr)
..... K
..... K
..... K

T(β Lyr)
128450 K
70770 K
..... K

Lage der Linien

H γ	H β	HeI	H α	λ [nm]	H γ	H β	HeI	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
366	502	---	944	Punkte	(360?)	504	770	952

Nullpunkte der Spektren				λ [nm]
295.1	295.6		297.0	(297.4) 294.9 295.4 295.1
Mittelwerte der Nullpunkte				λ [nm]
				295.9

Lage der Bereiche

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
312	324	342	314	329	344	
431	446	461	433	448	463	
549	564	579	551	566	581	
655	670	685	657	672	687	
800	815	830	802	817	832	
866	881	896	868	883	898	
971	986	1001	973	988	1003	

Mittelwerte der Bereiche

1.3610	B1	1.7938
2.8293	B2	2.6713
3.2088	B3	3.0197
1.3546	B4	1.8950
0.6283	B5	0.6284
0.4222	B6	0.4183
0.2095	B7	0.2342

Bereichkomb.	T(Lyr)	T(β Lyr)	Bereichkomb.	T(Lyr)	T(β Lyr)
B1/B2	 K	 K	B3/B4	 K	23710 K
B1/B3	 K	 K	B3/B5	 K	37810 K
B1/B4	 K	 K	B3/B6	 K	48780 K
B1/B5	 K	 K	B3/B7	 K	23870 K
B1/B6	 K	 K	B4/B5	 K	 K
B1/B7	 K	 K	B4/B6	 K	 K
B2/B3	 K	 K	B4/B7	 K	22870 K
B2/B4	 K	77000 K	B5/B6	 K	 K
B2/B5	 K	80000 K	B5/B7	 K	13590 K
B2/B6	 K	 K	B6/B7	 K	8710 K
B2/B7	 K	18160 K

Lage der Linien

H β	HeI	H α	λ [nm]	H β	HeI	H α
486.1	587.5	656.3		486.1	587.5	656.3
.....			Punkte			

Nullpunkte der Spektren

.....		472.6	λ [nm]		471.8	471.9
-------	-------	-------	----------------	-------	-------	-------

Mittelwerte der Nullpunkte

472.6	λ [nm]	471.8
-------	----------------	-------

Lage der Bereiche

182 - 197 - 212	R1: 545 nm	184 - 199 - 214
359 - 374 - 389	R2: 610 nm	361 - 376 - 391
550 - 565 - 580	R3: 680 nm	552 - 567 - 582

Mittelwerte der Bereiche

2.7124	R1	2.5948
1.3317	R2	1.3002
0.5564	R3	0.5850

Bereichkombination	T(Lyr)	T(β Lyr)
R1/R2	 K	 K
R1/R3	 K	2309 K
R2/R3	 K	1571 K

Lage der Linien

H β	He I	H α	λ [nm]	H β	He I	H α
486.1	587.5	656.3	Punkte	486.1	587.5	656.3
.....		413			306	495
			Nullpunkte der Spektren			
.....		475.2	λ [nm]		475.1	474.4
			Mittelwerte der Nullpunkte			
475.2			λ [nm]	474.8		

Lage der Bereiche

175	- 190	- 205	R1: 545 nm	176	- 191	- 206
352	- 367	- 383	R2: 610 nm	353	- 368	- 383
542	- 557	- 573	R3: 680 nm	544	- 559	- 574
			Mittelwerte der Bereiche			
2.7576			R1	2.7096		
1.3096			R2	1.2981		
0.5041			R3	0.5553		

Bereichkombination	T(β Lyr)
R1/R2	nicht berechnbar
R1/R3	20430 K
R2/R3	12358 K

Lage der Linien

H α	H β	HeI	H α	λ [nm]	H α	H β	HeI	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
357	492	---	938	Punkte	(369?)	496	762	944

Nullpunkte der Spektren				λ [nm]	Nullpunkte			
278.6	299.4	---	300.4		(294.0)	297.9	298.4	298.1
Mittelwerte der Nullpunkte				λ [nm]	Mittelwerte			
					298.2			

Lage der Bereiche

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
303	318	333	306	321	336	
421	436	451	425	440	455	
540	555	570	542	558	573	
645	660	675	649	664	679	
790	805	820	794	809	824	
856	871	886	860	875	890	
962	977	992	965	980	995	

Mittelwerte der Bereiche

2.10793	B1	1.8456
2.72800	B2	2.6804
2.83444	B3	2.0421
1.24433	B4	1.2508
0.55666	B5	0.5858
0.36244	B6	0.3909
0.17244	B7	0.1892

Bereichkomb.	T(Lyr)	T(β Lyr)	Bereichkomb.	T(Lyr)	T(β Lyr)
B1/B2	 K	13.510 K	B3/B4	 K	12.8240 K
B1/B3	 K	19.360 K	B3/B5	 K	10.0527 K
B1/B4	 K	26.340 K	B3/B6	 K	5.4400 K
B1/B5	 K	30.610 K	B3/B7	 K	3.8390 K
B1/B6	 K	29.120 K	B4/B5	 K	7.9610 K
B1/B7	 K	28.510 K	B4/B6	 K	3.6520 K
B2/B3	 K	41.620 K	B4/B7	 K	2.8140 K
B2/B4	 K	59.620 K	B5/B6	 K	1.6250 K
B2/B5	 K	66.110 K	B5/B7	 K	1.7180 K
B2/B6	 K	50.540 K	B6/B7	 K	1.7600 K
B2/B7	 K	18.910 K

Lage der Linien

Hβ	He I	Hα	λ [nm]	Hβ	He I	Hα
486.1	587.5	656.3		486.1	587.5	656.3
.....		493	Punkte		310	498

Nullpunkte der Spektren

.....		475.2	λ [nm]		473.6	473.3
-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

Mittelwerte der Nullpunkte

475.2	λ [nm]	473.5
-------	--------	-------

Lage der Bereiche

175 - 190 - 205	R1: 545 nm	180 - 195 - 210
352 - 367 - 382	R2: 610 nm	357 - 372 - 387
542 - 557 - 572	R3: 680 nm	547 - 562 - 577

Mittelwerte der Bereiche

2.7576	R1	2.7208
1.3096	R2	1.2618
0.5041	R3	0.4896

Bereichkombination	T(Lyr)	T(βLyr)
R1/R2	 K	 K
R1/R3	 K	65100 K
R2/R3	 K	37940 K

Lage der Linien

H γ	H β	HeI	H α	λ [nm]	H γ	H β	HeI	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
358	493	...	940	Punkte	372	491	756	938

Nullpunkte der Spektren

298.2	299.1		299.7	λ [nm]	292.9	299.8	300.7	300.4
	299.0			Mittelwerte der Nullpunkte			300.3	
				λ [nm]				

Lage der Bereiche

204	319	334	B1: 420 nm	300	315	330
423	438	453	B2: 465 nm	419	434	449
541	556	571	B3: 510 nm	538	553	568
647	662	677	B4: 550 nm	643	658	673
792	807	822	B5: 605 nm	788	803	818
857	872	887	B6: 630 nm	854	869	884
963	978	993	B7: 670 nm	959	974	989

Mittelwerte der Bereiche

1.9912	B1	1.8082
2.7424	B2	2.6521
3.0517	B3	2.0516
1.2339	B4	1.2938
0.5452	B5	0.5979
0.3653	B6	0.3995
0.1746	B7	0.1986

Bereichkomb.

Bereichkomb.	T(β Lyr)	K
B1/B2	16760	K
B1/B3	21900	K
B1/B4	24100	K
B1/B5	28320	K
B1/B6	30170	K
B1/B7	27580	K
B2/B3	32380	K
B2/B4	27380	K
B2/B5	35170	K
B2/B6	38640	K
B2/B7	16690	K

Bereichkomb.

Bereichkomb.	T(β Lyr)	K
B3/B4	22330	K
B3/B5	36450	K
B3/B6	41750	K
B3/B7	28770	K
B4/B5	29710	K
B4/B6	81810	K
B4/B7	31200	K
B5/B6	59236	K
B5/B7	18850	K
B6/B7	13160	K

Lage der Linien

Hβ	HeI	Hα	λ [nm]	Hβ	HeI	Hα
486.1	587.5	656.3	Punkte	486.1	587.5	656.3
.....						
			Nullpunkte der Spektren			
.....			λ [nm]			

Mittelwerte der Nullpunkte

.....			λ [nm]			
	475.2			475.8	475.9	

Lage der Bereiche

175	- 190	- 205	R1: 545 nm	173	- 188	- 203
.....						
252	- 367	- 382	R2: 610 nm	350	- 365	- 380
.....						
542	- 557	- 572	R3: 680 nm	541	- 556	- 571
.....						

Mittelwerte der Bereiche

.....			R1			
.....			R2			
.....			R3			
2.7353				2.6574		
1.2937				1.2814		
0.5270				0.5421		

Bereichkombination	T(βLyr)
R1/R2	?
R1/R3	?..... K
R2/R3	?..... K
	?3850 K

Lage der Linien

Hγ	Hβ	He I	Hα	λ [nm]	Hγ	Hβ	He I	Hα
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
360	496	...	943	Punkte	...	488	754	935

Nullpunkte der Spektren				λ [nm]	Mittelwerte der Nullpunkte		
297.4	297.9		298.5		301.0	301.4	301.6
	298.0					301.3	

Lage der Bereiche

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
307	322	337	420	465	510	550
425	440	455	416	431	446	461
564	559	574	535	550	565	580
649	664	679	641	656	671	686
794	809	824	785	800	815	830
860	875	890	851	866	881	896
965	980	995	957	972	987	1002

Mittelwerte der Bereiche

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
2.1046	1.4840	2.1586	1.3334	0.6322	0.4071	0.2202
2.6938	3.1681	2.1586	1.3334	0.6322	0.4071	0.2202
3.0098	3.1681	2.1586	1.3334	0.6322	0.4071	0.2202
1.2334	1.3334	2.1586	1.3334	0.6322	0.4071	0.2202
0.5546	0.6322	2.1586	1.3334	0.6322	0.4071	0.2202
0.3771	0.4071	2.1586	1.3334	0.6322	0.4071	0.2202
0.1760	0.2202	2.1586	1.3334	0.6322	0.4071	0.2202

Bereichkomb.	T(Lyr)	T(βLyr)	Bereichkomb.	T(Lyr)	T(βLyr)
B1/B2	 K	0.6528 K	B3/B4	 K	30750 K
B1/B3	 K	0.9074 K	B3/B5	 K	11960 K
B1/B4	 K	11610 K	B3/B6	 K	14230 K
B1/B5	 K	13700 K	B3/B7	 K	11960 K
B1/B6	 K	15590 K	B4/B5	 K	56800 K
B1/B7	 K	13570 K	B4/B6	 K	 K
B2/B3	 K	18710 K	B4/B7	 K	18500 K
B2/B4	 K	27180 K	B5/B6	 K	8900 K
B2/B5	 K	32650 K	B5/B7	 K	6800 K
B2/B6	 K	49880 K	B6/B7	 K	6220 K
B2/B7	 K	14360 K

Lage der Linien

Hβ	HeI	Hα	λ [nm]	Hβ	HeI	Hα
486.1	587.5	656.3		486.1	587.5	656.3
.....		497	Punkte		304	488

Nullpunkte der Spektren

.....		473.7	λ [nm]		475.8	476.3
-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

Mittelwerte der Nullpunkte

473.7	λ [nm]	476.0
-------	--------	-------

Lage der Bereiche

179	-	194	-	209	173	-	188	-	203
356	-	371	-	386	350	-	365	-	380
544	-	563	-	577	540	-	555	-	570

Mittelwerte der Bereiche

2.6899	R1	2.4339
1.2269	R2	1.4175
0.4942	R3	0.6839

Bereichkombination	T(Lyr)	T(βLyr)
R1/R2	 K	.9420 K
R1/R3	 K	.8100 K
R2/R3	 K	.8300 K

Lage der Linien

H γ	H β	HeI	H α	λ [nm]	H γ	H β	HeI	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
3.62	4.97	...	9.44	Punkte	3.48?	4.84	7.51	9.32

Nullpunkte der Spektren

296.7	297.5		298.1	λ [nm]	302.0	302.5	302.6	302.7
	297.4			Mittelwerte der Nullpunkte			302.4	

Lage der Bereiche

3.68	3.23	3.38	295	B1: 420 nm	310	325
4.22	4.42	4.57	414	B2: 465 nm	429	444
5.45	5.60	5.75	532	B3: 510 nm	547	562
6.51	6.66	6.81	638	B4: 550 nm	653	668
7.96	8.11	8.26	783	B5: 605 nm	798	813
8.62	8.77	8.92	848	B6: 630 nm	863	878
9.67	9.82	9.97	954	B7: 670 nm	969	984

Mittelwerte der Bereiche

1.9210	B1	1.3352
2.7203	B2	2.4101
2.0459	B3	2.3443
1.3632	B4	1.4805
0.5807	B5	0.7339
0.3839	B6	0.5072
0.1998	B7	0.2443

Bereichkomb.	T(Lyr)	T(β Lyr)	Bereichkomb.	T(Lyr)	T(β Lyr)
B1/B2	 K	8240 K	B3/B4	 K	17540 K
B1/B3	 K	8580 K	B3/B5	 K	26090 K
B1/B4	 K	10040 K	B3/B6	 K	11470 K
B1/B5	 K	11840 K	B3/B7	 K	28210 K
B1/B6	 K	11610 K	B4/B5	 K	48100 K
B1/B7	 K	13360 K	B4/B6	 K	19960 K
B2/B3	 K	8820 K	B4/B7	 K	37180 K
B2/B4	 K	11050 K	B5/B6	 K	8860 K
B2/B5	 K	14290 K	B5/B7	 K	28840 K
B2/B6	 K	13510 K	B6/B7	 K	 K
B2/B7	 K	11810 K

Lage der Linien

H β	HeI	H α		H β	HeI	H α
486.1	587.5	656.3	λ [nm]	486.1	587.5	656.3
.....		488	Punkte		383	486

Nullpunkte der Spektren

.....		473.0	λ [nm]		476.2	474.1
-------	-------	-------	----------------	-------	-------	-------

Mittelwerte der Nullpunkte

473.0	λ [nm]	475.1
-------	----------------	-------

Lage der Bereiche

181	-	196	-	211	175	-	190	-	205
358	-	373	-	388	353	-	367	-	382
548	-	563	-	578	543	-	558	-	573
					R1: 545 nm				
					R2: 610 nm				
					R3: 680 nm				

Mittelwerte der Bereiche

2.6151	R1	2.6140
1.2880	R2	1.4023
0.5146	R3	0.6554

Bereichkombination	T(Lyr)	T(β Lyr)
R1/R2	 K	24740 K
R1/R3	 K	12200 K
R2/R3	 K	9600 K

Lage der Linien

H γ	H β	HeI	H α	λ [nm]	H γ	H β	HeI	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
358	493	...	940	Punkte	(377)	493	750	931

Nullpunkte der Spektren				λ [nm]	Nullpunkte der Spektren			
298.9	299.1	...	299.7	(291.0)	299.1	303.0	303.1	
Mittelwerte der Nullpunkte				λ [nm]	Mittelwerte der Nullpunkte			
299.0					301.7			

Lage der Bereiche

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
304	319	334	349	364	379	394
403	418	433	448	463	478	493
501	516	531	546	561	576	591
607	622	637	652	667	682	697
702	717	732	747	762	777	792
807	822	837	852	867	882	897
902	917	932	947	962	977	992

Mittelwerte der Bereiche

1.8764	B1	1.5325
2.8891	B2	2.6546
3.0893	B3	2.1100
1.2472	B4	1.3822
0.5877	B5	0.6300
0.3944	B6	0.4427
0.1684	B7	0.2203

Bereichkomb.	T(Lyr)	T(γ Lyr)	Bereichkomb.	T(Lyr)	T(γ Lyr)
B1/B2		K 11017	B3/B4		K 12186
B1/B3		K 10696	B3/B5		K 17533
B1/B4		K 11573	B3/B6		K 14780
B1/B5		K 12991	B3/B7		K 13617
B1/B6		K 12646	B4/B5		K 29110
B1/B7		K 12559	B4/B6		K 16710
B2/B3		K 11179	B4/B7		K 14333
B2/B4		K 11602	B5/B6		K 8842
B2/B5		K 14407	B5/B7		K 9822
B2/B6		K 13493	B6/B7		K 10768
B2/B7		K 13075

Lage der Linien

H β	He I	H α		H β	He I	H α
486.1	587.5	656.3	λ [nm]	486.1	587.5	656.3
.....			Punkte			

Nullpunkte der Spektren

.....		474.8	λ [nm]		473.6	473.7
-------	-------	-------	----------------	-------	-------	-------

Mittelwerte der Nullpunkte

474.8	λ [nm]	473.7
-------	----------------	-------

Lage der Bereiche

176	191	206	R1: 545 nm	179	194	206
.....			R2: 610 nm			
353	368	383	R3: 680 nm	356	371	386
.....						
544	559	574		547	562	577
.....						

Mittelwerte der Bereiche

2.7910	R1	2.6800
1.3858	R2	1.3036
0.5115	R3	0.5513

Bereichkombination	T(Lyr)	T(γ Lyr)
R1/R2	 K	14851 K
R1/R3	 K	10330 K
R2/R3	 K	11711 K

Lage der Linien

H γ	H β	HeI	H α	λ [nm]	H γ	H β	HeI	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
364	500	...	944	Punkte	364	499	...	946

Nullpunkte der Spektren				λ [nm]	Mittelwerte der Nullpunkte			
295.9	296.4		298.1		295.9	296.8		297.4
	296.8			λ [nm]			296.7	

Lage der Bereiche

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
310	325	340				
429	443	458				
547	562	577				
653	667	682				
797	812	827				
863	878	893				
969	984	999				

Mittelwerte der Bereiche

2.0791	B1	2.0253
2.6251	B2	2.7169
2.0605	B3	2.0579
1.3006	B4	1.2803
0.5671	B5	0.5710
0.3542	B6	0.3909
0.1701	B7	0.1975

Bereichkomb.	T(Lyr)	T(δ Lyr)	Bereichkomb.	T(Lyr)	T(δ Lyr)
B1/B2		K 12996	B3/B4		K 27267
B1/B3		K 17279	B3/B5		K 21534
B1/B4		K 18388	B3/B6		K 14130
B1/B5		K 18867	B3/B7		K 12771
B1/B6		K 15986	B4/B5		K 17709
B1/B7		K 15115	B4/B6		K 10910
B2/B3		K 33154	B4/B7		K 10476
B2/B4		K 30447	B5/B6		K 5983
B2/B5		K 25367	B5/B7		K 7517
B2/B6		K 17775	B6/B7		K 9559
B2/B7		K 15827

Lage der Linien

H β	He I	H α		H β	He I	H α
486.1	587.5	656.3	λ [nm]	486.1	587.5	656.3
.....			Punkte			

Nullpunkte der Spektren

.....		472.6	λ [nm]			472.2
-------	-------	-------	----------------	-------	-------	-------

Mittelwerte der Nullpunkte

472.6	λ [nm]	472.2
-------	----------------	-------

Lage der Bereiche

182	184	212		183	198	213
359	374	389	R1: 545 nm	360	375	390
550	565	580	R2: 610 nm	551	566	581
.....			R3: 680 nm			

Mittelwerte der Bereiche

2.7013	R1	2.7598
1.5344	R2	1.2376
0.4994	R3	0.5142

Bereichkombination	T(Lyr)	T(γ Lyr)
R1/R2	 K	28374 K
R1/R3	 K	19147 K
R2/R3	 K	14139 K

Lage der Linien

H γ	H β	HeI	H α	λ [nm]	H γ	H β	HeI	H α
434.0	486.1	587.5	656.3		434.0	486.1	587.5	656.3
363	499	...	945	Punkte	359	494	...	941

Nullpunkte der Spektren

	λ [nm]		λ [nm]
296.3	296.6	...	297.8
...	...	...	298.7
...	...	...	...
...	...	...	299.3
...	297.0	...	...
...	...	...	298.6

Mittelwerte der Nullpunkte
 λ [nm]

Lage der Bereiche

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
309	224	339	305	320	335	
428	443	458	474	489	454	
546	561	576	565	557	572	
653	667	682	648	663	678	
777	812	827	793	808	823	
863	878	893	858	873	888	
968	983	998	964	979	994	

Mittelwerte der Bereiche

2.2031	B1	3.0973
2.6661	B2	2.6945
2.0333	B3	3.0265
1.1968	B4	1.2250
0.5234	B5	0.5676
0.2219	B6	0.3665
0.1545	B7	0.1167

Bereichkomb.	T(Lyr)	T(γ Lyr)	Bereichkomb.	T(Lyr)	T(γ Lyr)
B1/B2		K 15554 K	B3/B4		K 20819 K
B1/B3		K 19536 K	B3/B5		K 18586 K
B1/B4		K 19143 K	B3/B6		K 18627 K
B1/B5		K 19227 K	B3/B7		K 20031 K
B1/B6		K 19601 K	B4/B5		K 16529 K
B1/B7		K 20847 K	B4/B6		K 16966 K
B2/B3		K 30634 K	B4/B7		K 19577 K
B2/B4		K 25486 K	B5/B6		K 19253 K
B2/B5		K 22236 K	B5/B7		K 25148 K
B2/B6		K 22121 K	B6/B7		K 33490 K
B2/B7		K 23352 K

Lage der Linien

Hβ	He I	Hα	λ [nm]	Hβ	He I	Hα
486.1	587.5	656.3		486.1	587.5	656.3
.....			Punkte			

Nullpunkte der Spektren

.....		472.6	λ [nm]			474.8
-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

Mittelwerte der Nullpunkte

.....	442.6	λ [nm]		474.8
-------	-------	--------	-------	-------

Lage der Bereiche

182 - 197 - 212	R1: 545 nm	176 - 191 - 206
224 - 231 - 239	R2: 610 nm	353 - 362 - 383
350 - 365 - 380	R3: 680 nm	544 - 559 - 574

Mittelwerte der Bereiche

2.7759	R1	2.7657
1.1850	R2	1.2092
0.4539	R3	0.4703

Bereichkombination	T(Lyr)	T(λ Lyr)
R1/R2	 K	24380 K
R1/R3	 K	21974 K
R2/R3	 K	19920 K

Auswahl von Literatur über Beta Lyrae

Publikationen zum Thema Beta Lyrae mit kurzer Inhaltskennzeichnung.

1.

APJ = The Astrophysical Journal

<u>80</u> , 51, 1934	Spektrum
<u>81</u> , 173, 1935	Farbe
<u>93</u> , 92, 1941	fünf zusammenfassende Artikel
<u>120</u> , 271, 1954	Spektrum
274, 1954	Rotation des Hauptsterns
<u>130</u> , 817, 1959	Absorptions - Spektrum
<u>131</u> , 111, 1960	Radialgeschwindigkeiten
363, 1960	Photometrie
<u>132</u> , 162, 1960	Gasströme
<u>133</u> , 519, 1961	Spektrum
<u>134</u> , 161, 1961	Spektrum
<u>135</u> , 429, 1962	Mehrfachsystem
424, 1962	Veränderungen im Spektrum (nichtperiodisch)
<u>136</u> , 903, 1962	Masse
<u>138</u> , 342, 1963	System
<u>141</u> , 145, 1965	Sechs Farben Photometrie
155, 1965	Massen, Geometrie
1390, 1965	Polarisation
<u>161</u> , 1011, 1970	Massenaustausch
<u>189</u> , 319, 1974	2. Komponente
<u>198</u> , 453, 1975	UV - Spektrum
<u>204</u> , 151, 1976	Theorie der Lichtkurve
512, 1976	Entwicklungsmodell
<u>206</u> , 777, 1976	UV - Spektrum
<u>208</u> , 468, 1976	UV- Emissionslinien
780, 1976	System
<u>210</u> , 853, 1976	Spektroskopie mit hoher Zeitauflösung (H α)
<u>7</u> , 1, 1893	Spektrum
<u>149</u> , 353, 1967	Polarisation

2.

PASP = Publications of the Astronomical Society of the Pacific

<u>70</u> , 5, 1958	System
209, 1958	Spektrum
313, 1958	Spektrum (visuell, IR)
585, 1958	Radialgeschwindigkeit
<u>71</u> , 441, 1959	Photometrische und spektroskopische Besonderheiten
<u>72</u> , 348, 1960	Mehrfachsystem
403, 1960	Spektrum
<u>82</u> , 345, 1970	Photometrie
<u>83</u> , 357, 1971	Photometrie
<u>85</u> , 133, 1973	Photometrie
599, 1973	H α Emissionslinie

3.

Nature

<u>233</u> , 110, 1971	Schwarzes Loch
<u>234</u> , 406, 1971	Schwarzes Loch
<u>235</u> , 270, 1972	Radiobeobachtungen
<u>236</u> , 218, 1972	2. Komponente
<u>238</u> , 5, 1972	Magnetfelder
<u>245</u> , Phys. Sci., 36, 1973	Schwarzes Loch
<u>249</u> , 534, 1974	UV - Beobachtungen

4.

Verschiedene Veröffentlichungen

Trans. Am. Phil. Soc., <u>49</u> , Pt.1,4, 1959	Spektrum
Astron. Astrophys. Suppl., <u>19</u> , 57, 1975	Spektrum
Zeitschr. f. Astrophysik, <u>39</u> , 133, 1956	System
<u>62</u> , 203, 1965	Chemische Zus.
Ark. f. Astr., <u>5</u> , 253, 1969	Photometrie
A. J. U.S.S.R., <u>36</u> , 766, 1959	Chem. Zusammensetzung

Herrn Professor Wellmann bin ich für die Überlassung des sehr interessanten Themas zu Dank verpflichtet; ebenso Herrn Dr. Schoembs für die intensive Betreuung während der Arbeit. Bei Herrn Prof. Groth und Herrn Dr. Barwig bedanke ich mich für die Hilfe bei der Beschaffung der von M. Hack aufgenommenen Spektren.

Allen Institutsmitgliedern, besonders auch Herrn Gottwald, bin ich für die angenehme Arbeitsatmosphäre und so manche Anregung und Hilfe dankbar.

Schliesslich bedanke ich mich auch noch bei meiner Frau, die durch ihr Verständnis und ihre Hilfe den Abschluss des Studiums ermöglichte.

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe.

München, den

(Helmut Steinle)